

Aves en la Región de Antofagasta

Roberto
Aguilar • Marietta
Perucci • Aracelli
Marín



Aves en la Región de Antofagasta

Roberto Aguilar Pulido • Marietta Perucci Letelier • Aracelli Marín Aguilar



CULTAM

Patrimonio Cultural y Natural • Conservación • Educación

Antofagasta, 2017

Aves en la Región de Antofagasta

Registro de propiedad intelectual: 282258

ISBN: 978-956-368-785-9

Edición:

Roberto Aguilar Pulido

Fotografías y textos:

Roberto Aguilar Pulido

Marietta Perucci Letelier

Aracelli Marín Aguilar

Identificación de especies de aves:

Charly Moreno Taucare (Validador eBirds - Chile)

Ariel Silva Narváez

Colaboración fotografías, páginas:

Nelson Amado Pool: 118, 267, 304, 305, 314, 335.

Patricia Bolados Díaz: 48, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 78, 79, 111, 186, 226, 292.

Marcos Cortés Araya: 136, 148, 149, 312.

Jorge Fuentes Figueroa: 95, 128, 129, 135, 235.

Sylvia Hernández Aquez (Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico): 194, 195.

Valeria Lopes Martins: 137.

Guillermo Luna Jorquera: 47.

Charly Moreno Taucare: 63, 76, 77, 109, 167, 168, 239, 244, 245, 251, 257, 268, 269, 270, 271, 275, 301, 311.

Juan Menares Henríquez: 50, 187.

Freddy Olivares Cortés: 313.

José Otaíza Valenzuela: 17.

Aldo Pacheco Velásquez: 51.

Manuel Rojo Rojo: 68.

Ariel Silva Narváez: 36, 37, 38, 39, 86, 87, 108, 156, 157, 216, 217, 218, 294, 295, 330, 331, 338.

Roberto Villablanca Montaña: 34, 41, 102, 119.

Carlos Zavalaga Reyes: 232.

Diseño y diagramación:

Artemio +

Corrección de estilo:

Jorge Cifuentes Castillo

Colabora:

Minera Escondida Limitada

Operada por BHP Billiton

Impresión:

GraficAndes®

Primera edición de 1.000 ejemplares, octubre de 2017.

Fotografía portada:

Roberto Aguilar Pulido

Pelícano con plumaje de reposo (no reproductivo).

Como citar este libro:

Aguilar, R., M. Perucci y A. Marín 2017. Aves en la Región de Antofagasta. Corporación Cultam. 344 páginas.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, transmitida o almacenada, ya sea por procedimientos mecánicos, ópticos o químicos, incluidas las fotocopias, sin el permiso escrito de los autores de esta obra.

El mapa que aparece en este libro, que se refiere o relacione con los límites y fronteras de Chile, no compromete, en modo alguno, al Estado de Chile.

Agradecimientos

Agradecemos el aporte de Minera Escondida Limitada por contribuir en la elaboración, diseño y edición de este libro. Este trabajo de gran valor para la comunidad científica, educativa, y sociedad civil está alineado con la gestión medioambiental de la Compañía, orientado al cuidado y protección de la biodiversidad.

De manera especial, agradecemos el apoyo de Patricio Vilaplana Barberis, Alexis Soto Carrillo y Oscar Zepeda Longa.





Aguilucho juvenil en Quillagua
Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

También quisiéremos expresar nuestro sentimiento de gratitud a todas aquellas personas que desinteresadamente nos apoyaron de diversas maneras en el desarrollo de este proyecto. Especialmente a: Cristián Estades Marfan, por escribir el prólogo y sugerencias respecto de las especies presentadas; Charly Moreno Taucare y Ariel Silva Narváez por sus fotografías, la ayuda en la identificación de las especies y sugerencias respecto de la publicación; Alejandro Simeone Cabrera y Arami Silva Marín por la revisión y sugerencias del contenido de los textos; Jorge Cifuentes Castillo, por la corrección ortográfica y de estilo; Juan Menares Henríquez por sus fotografías y las salidas a navegar en busca de especies marinas frente a la costa de Mejillones. A Nelson Amado Pool, Patricia Bolados Díaz, Marcos Cortés Araya, Jorge Fuentes Figueroa, Sylvia Hernández Aquez (Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico), Valeria Lopes Martins, Guillermo Luna Jorquera, Freddy Olivares Cortés, José Otaíza Valenzuela, Aldo Pacheco Velásquez, Manuel Rojo Rojo, Roberto Villablanca Montañó y Carlos Zavalaga Reyes, por colaborarnos con sus mejores fotografías.

Con mucho cariño queremos agradecer a Patricio Aguilar Pulido y Ximena Meneses Flores por las sugerencias, hospitalidad y las ricas comidas en su casa de Calama, cuando andábamos “pajareando” por el interior de nuestra región y también a Miguel Silva Melo por acompañarnos en esos viajes. Nuestra especial gratitud a Javier Muñoz Carrazana, y muy especialmente a Mauricio Rebolledo Sagredo por todo su apoyo en los inicios de este proyecto.

Roberto, Marietta y Aracelli
Antofagasta, mayo 2017.-



Picaflor del norte alimentando a sus polluelos
Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Prólogo

Mi primera experiencia en el desierto fue hace más de dos décadas, justamente en la Región de Antofagasta, donde viví por más de un año. Como ornitólogo aficionado, en un principio temí que un paisaje tan seco pudiera no ser un buen lugar para observar aves. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que mi aprensión era infundada. Así, aprendí que, a pesar de la aridez dominante, la región está repleta de rincones fascinantes donde es posible encontrar innumerables organismos y, por supuesto, aves. Aprendí a detenerme a observar cada aguada y esperar a los emplumados visitantes que de seguro llegarían, y a mirar detrás de cada tola, queñoa o paja brava en busca de alguna tímida avecilla de color café. Aprendí también que cada laguna o bofedal es un potencial tesoro ornitológico y que la costa del desierto es un verdadero hervidero de aves marinas. Quizás uno de los episodios más significativos de mi demasiado corta estadía en Antofagasta fue la oportunidad que tuve de visitar una colonia de gaviotas garumas. Lealtad se llamaba el lugar, y Roberto Aguilar realizaba un estudio sobre la reproducción de esta maravillosa ave que nidifica en medio del desierto absoluto. La escena surrealista de una colonia de aves marinas en un paisaje marciano es imposible de olvidar. Cada vez que recuerdo las huellas que el sol dejó en mi piel después de esa visita no puedo sino aumentar mi admiración por estas aves increíbles.

En aquella época, mi única referencia sobre las aves de Chile era un pequeño libro con dibujos en blanco y negro ¡Qué hubiera dado yo en ese tiempo por un documento como el que ahora tienes en tus manos! Esta bella publicación sobre las aves de la Región de Antofagasta es una enorme contribución a la difusión sobre el rico patrimonio ornitológico de la región. Hermosamente ilustrado con fotos de gran calidad, este libro es un estímulo fabuloso para salir a recorrer el desierto más árido del planeta, desde la costa al altiplano, en busca de algunos de sus más notables habitantes. Siempre he tenido la impresión que la gente de Antofagasta es particularmente orgullosa de su región. Estoy seguro de que, al acercar a las personas al conocimiento de las aves con las que comparten el territorio, este libro contribuirá a incrementar aún más ese orgullo.

Dr. Cristián F. Estades
Profesor Titular
Universidad de Chile

Introducción

Este libro ha sido concebido con la intención de contribuir al conocimiento y a la valoración de la rica avifauna de la Región de Antofagasta. Es una presentación de 161 especies de aves, de un total aproximado de 250 especies que habitan o visitan la Región de Antofagasta principalmente durante la época estival (eBirds - Chile, 2017). La mayoría de las especies que no se presentan corresponden a aves marinas, algunas migrantes y otras errantes, que por su condición y su reducido número son de difícil observación, ya que entre otras cosas, el azar juega un rol importante. No obstante, al final del libro se entrega una lista de las especies no incluidas en esta presentación.

Cada ave es identificada con su nombre común en castellano e inglés, además del nombre científico escrito en Latín que consta de género y especie (ej. *Anas puna*). Algunas especies presentan una tercera identificación (ej. *Rhea pennata tarapacensis*), la cual hace referencia a una subespecie o raza. Los nombres comunes en castellano están según la guía “Aves de Chile, Sus Islas Oceánicas y Península Antártica” (E. Couve, C. Vidal y J. Ruiz, 2016). El orden taxonómico, los nombres científicos y los nombres comunes en inglés, están en base a “A classification of the bird species of South America” (American Ornithologists’ Union, 2017). Por otra parte, también se describen aspectos generales de cada una de las especies, primeramente haciendo mención al tamaño desde la cabeza a la cola e indicado con la letra “L” y, en algunos casos, a la envergadura, es decir la distancia entre ambas puntas de las alas cuando están completamente extendidas, indicado con la letra “E”; y luego, entregando información sobre la distribución, el hábitat indicando su rango altitudinal (metros sobre el nivel del mar = m.s.n.m.), la reproducción y comportamiento más característico. La información presentada es una compilación que tiene como base aquella publicada en: “Aves de Chile, Sus Islas Oceánicas y Península Antártica” (E. Couve, C. Vidal y J. Ruiz, 2016); “Aves de Chile” (A. Jaramillo, 2011); “Las Aves de Chile, una nueva guía de Campo” (D. Martínez y G. González, 2004) y la página web “Aves de Chile” (www.avesdechile.cl).

Anexo a la descripción de cada especie, se indica su Estado de Conservación según corresponda a los cuerpos legales emanados por el Gobierno de Chile: Ley de Caza N° 19.473 y Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres y sus respectivos Decretos Supremos (DS), y también a la categoría indicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)(Listas Rojas, www.redlist.org). El estado de conservación es una indicación sobre el nivel de amenaza o del riesgo de extinción que una especie determinada pudiese tener y, por ende es un elemento fundamental para definir prioridades y acciones de conservación. Las categorías de conservación mencionadas en este libro son defi-

nidas de la siguiente manera: **En Peligro:** especie que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre; **Vulnerable:** especie que está en riesgo alto de extinción en estado silvestre; **Casi amenazada:** especie que no puede ser categorizada en las categoría anteriores (En Peligro o Vulnerable), pero está muy próxima en un futuro cercano a cumplir con los requisitos de clasificación en alguna de dichas categorías; **Rara:** especie cuya población, ya sea por tener una distribución geográfica muy restringida o por encontrarse en los últimos estadios de su proceso de extinción natural, es y ha sido escasa desde tiempos inmemoriales; **Preocupación menor:** especie que siendo evaluada no cumple con ninguno de los requisitos para las categorías enunciadas anteriormente, generalmente es una especie abundante y de amplia distribución; **Datos insuficientes (Insuficientemente conocida):** especie de la cual se carece de información adecuada para hacer una evaluación de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. En Chile las categorías que priman son las indicadas en el Reglamento de Clasificación de las Especies; de no existir ésta, se considera la indicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Todas las fotografías que se exhiben corresponden a especies observadas en la Región de Antofagasta y en áreas inmediatamente adyacentes. Las aves presentes en la región ocupan prácticamente todos los ambientes que la caracterizan, desde la costa hasta la cordillera: lagos, lagunas, bofedales, ríos, pastizales, vegas, planicies desérticas, cerros, quebradas, oasis, estuarios y playas de arena y/o rocas. Por tal razón, para cada ave presentada se menciona el lugar de avistamiento, y también como una forma de invitar al lector a visitar dichas localidades para su observación. El número que se indica entre paréntesis después del nombre de la localidad, corresponde a la ubicación en el mapa de la región que se muestra en la página N° 13.

ÍNDICE
AVES EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

16 Suri	82 Yeco	148 Batitú	214 Tortolita de la puna	280 Dormilona fraile
18 Kiula	84 Pelicano común	150 Becasina de la puna	216 Tortolita quiguagua	282 Dormilona tontita
20 Pato colorado	86 Garcita azulada	152 Pitotoy grande	218 Pequén	284 Mero de Tarapacá
22 Pato gargantillo	88 Garza azul	154 Playero blanco	220 Tucúquere	286 Mero gaucho
24 Pato jergón chico	90 Garza bueyera	156 Playero de ala blanca	222 Gallina ciega común	288 Sietecolores
26 Pato jergón grande	92 Garza chica	158 Playero de Baird	224 Picaflor del norte	290 Golondrina bermeja
28 Pato juarjual	94 Garza cuca	160 Playero de las rompientes	226 Carancho cordillerano	292 Golondrina de dorso negro
30 Pato puna	96 Garza grande	162 Playero de patas largas	228 Cernícalo	294 Golondrina de pecho pardo
32 Guayata	98 Garza tricolor	164 Playero pectoral	230 Halcón perdiguero	296 Chercán común
34 Blanquillo común (norte)	100 Huairavo común	166 Playero semipalmado	232 Halcón peregrino	298 Zorzal negro
36 Blanquillo común (sur)	102 Cuervo de pantano de la puna	168 Playero vuelvepedras	234 Traro	300 Tenca de alas blancas
38 Huala	104 Jote de cabeza colorada	170 Pollito de mar rojizo	236 Perico cordillerano	302 Bailarín chico común
40 Flamenco chileno	106 Aguilucho común	172 Pollito de mar tricolor	238 Tapaculo	304 Chirihue cordillerano
42 Parina chica	108 Peuco	174 Zarapito común	240 Minero chico	306 Chirihue dorado
44 Parina grande	110 Pidén común	176 Perdicita cojón	242 Minero común	308 Chirihue verdoso
46 Pingüino de Humboldt	112 Tagua andina	178 Perdicita común	244 Minero cordillerano	310 Diuca común
48 Albatros de Buller	114 Tagua chica	180 Perdicita cordillerana	246 Minero de la puna	312 Comesebo de los tamarugos
50 Albatros de ceja negra	116 Tagua común	182 Gaviota andina	248 Minero grande	314 Cometocino de dorso castaño
52 Albatros de Salvin	118 Tagua cornuda	184 Gaviota de Franklin	250 Bandurrilla común	316 Cometocino de Gay
54 Fardela blanca	120 Tagua de frente roja	186 Gaviota de las Galápagos	252 Bandurrilla de pico recto	318 Cometocino del norte
56 Fardela de dorso gris	122 Tagua gigante	188 Gaviota dominicana	254 Canastero cordillerano	320 Pájaro plomo
58 Fardela negra	124 Tagüita del norte	190 Gaviota garuma	256 Churrete acanelado del norte	322 Pizarrita
60 Petrel de Nueva Zelanda	126 Chorlo de campo	192 Gaviota peruana	258 Churrete costero	324 Plebeyo
62 Petrel gigante subantártico	128 Chorlo dorado	194 Gaviotín chico	260 Churrete de ala blanca	326 Yal común
64 Petrel negro	130 Chorlo de la puna	196 Gaviotín elegante	262 Tijeral común	328 Chincol
66 Petrel plateado	132 Chorlo nevado	198 Gaviotín monja	264 Trabajador	330 Reinita americana
68 Yunco de Humboldt	134 Chorlo semipalmado	200 Gaviotín sudamericano	266 Cachudito común	332 Loica peruana
70 Golondrina de mar chica	136 Chorlo cordillerano	202 Rayador	268 Cazamoscas boreal	334 Jilguero cordillerano
72 Golondrina de mar de collar	138 Queltehue común	204 Paloma de alas blancas	270 Cazamoscas tijereta	336 Jilguero negro
74 Piquero común	140 Queltehue de la puna	206 Paloma de ala moteada	272 Colegial del norte	338 Gorrión
76 Piquero de patas azules	142 Pilpilén común	208 Paloma doméstica	274 Diucón	
78 Guanay	144 Pilpilén negro	210 Tórtola común	276 Dormilona chica	
80 Lile	146 Caití	212 Tórtola cordillerana	278 Dormilona de nuca rojiza	



Aves en la Región de Antofagasta

Paríñas grandes alimentándose en el Salar de Ascotán
Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Suri

Rhea pennata tarapacensis



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 95 cm. En Chile están presentes 2 sub-especies de suri. La especie en la Región de Antofagasta se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama. Habita planicies y cerros de la zona del altiplano sobre los 3.000 m.s.n.m. Generalmente se ve en grupos pequeños o grupos familiares. De hábitos corredores, aunque camina pausadamente, frente al peligro huye alcanzando grandes velocidades. Se alimenta de hierbas, raíces, semillas, insectos y pequeños reptiles. Su nido es construido en el suelo, donde varias hembras ponen sus huevos, para luego ser incubados por el macho, el cual también se hace cargo de la crianza de los polluelos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 42/2011, Ministerio del Medio Ambiente). *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en el bofedal cerca de Machuca (13). A la derecha, un adulto en la zona de Neurara, al sur del Salar de Atacama (29).

Lesser Rhea



Fotografía: José Otaiza Valenzuela

Kiula (Perdiz de la puna)

Tinamotis pentlandii



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 42 cm. En Chile, la kiula se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama. Restringida al altiplano, habita pastizales y quebradas entre los 3.500 y 4.500 m.s.n.m. Gregaria y de hábitos terrestres. Es común verla en grupos bien constituidos y sedentarios que recorren el territorio buscando su alimento, preferentemente vegetales, aunque también come insectos. Nidifica en el suelo, colocando los huevos en algún espacio protegido por matas y vegetales (no construye nidos). Suele poner de 5 a 8 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos observados en El Tatio (7).

Puna Tinamou



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Pato colorado

Anas cyanoptera orinomus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 38 - 48 cm. En Chile hay 2 subespecies de pato colorado. La subespecie presente en la Región de Antofagasta, se distribuye únicamente entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta, desde el nivel del mar hasta los 5.000 m. de altitud. Habita lagunas, bofedales y desembocaduras de ríos. Se puede ver en pareja o grupos pequeños y generalmente asociado con otras especies de patos. Su vuelo se caracteriza por rápidos aleteos. Es de alimentación omnívora y filtra su alimento de la superficie y del fondo fangoso. Su nido lo ubica en el suelo, fuera del agua, donde pone de 6 a 10 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, una hembra observada en Quillagua (34). A la derecha, un macho en la desembocadura del Río Loa (33).

Cinnamon Teal



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Pato gargantillo

Anas bahamensis



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 48 - 51 cm. Esta especie de pato es un visitante estival que se distribuye ampliamente en Chile. Habita lagos, lagunas, tranques y desembocaduras de ríos. De comportamiento gregario, a veces se asocia con otros patos, especialmente con el pato jergón grande. Anida en el suelo lejos del agua. Pone entre 6 y 10 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 16/2016, Ministerio del Medio Ambiente), y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, la hembra tiene la cola más corta y el pico normalmente más apagado que el macho. Ambas imágenes corresponden a adultos observados en un reservorio de agua para riego en San Pedro de Atacama (15).

White-cheeked Pintail



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Pato jergón chico

Anas flavirostris oxyptera



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 40 - 41 cm. En Chile están presentes 2 subespecies de pato jergón chico. La subespecie en la Región de Antofagasta se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama entre los 2.500 y 4.500 m.s.n.m. Es común verlo en esteros, ríos, lagunas, pantanos y desembocaduras de ríos, formando bandadas o asociado con otras especies de aves, principalmente con el pato jergón grande. Es muy tímido, vuela al menor indicio de peligro, aunque algunos individuos en el altiplano son un poco más confiados. Se reproduce casi todo el año. Construye su nido oculto entre la vegetación, también en grietas o cuevas. Pone de 6 a 8 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a individuos adultos observados en el vado del Río Putana (12).

Yellow-billed Teal



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Pato jergón grande

Anas georgica



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 48 - 54 cm. Pato ampliamente distribuido en Chile, tanto en aguas dulces como salobres, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. de altitud. De comportamiento gregario, suele reunirse en bandadas con otras especies de patos. Tiene gran capacidad de vuelo con aleteo rápido y constante y en desplazamientos largos tiende a formar escuadrones de vuelo. Se alimenta de hierbas, semillas y algas. Su reproducción ocurre entre agosto y febrero. Construye su nido en una depresión en el suelo, cerca del agua, forrado con plumas pequeñas y pasto que usa para tapar a los huevos durante la ausencia de la hembra. Pone de 4 a 10 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto volando sobre el Río Loa en Quillagua (34). A la derecha, un adulto nadando en el mismo río cerca del Puente Teresa, aproximadamente 40 km. al sur de Quillagua (35).

Yellow-billed Pintail



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Pato juarjual

Lophonetta specularioides alticola



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 50 - 60 cm. En Chile existen 2 subespecies de pato juarjual. La subespecie en la Región de Antofagasta, se distribuye de la Región de Arica y Parinacota a la Región del Maule. Es predominantemente andino, habita lagos, lagunas y bofedales hasta los 4.600 m.s.n.m. Durante la reproducción se puede encontrar en pareja o en grupos familiares y durante el invierno se ve en grupos mayores. De comportamiento territorial y agresivo con otras especies de aves, aunque confiado frente a los humanos. Se alimenta principalmente de invertebrados acuáticos y vegetales. Nidifica en bofedales de lagunas o salares, en islotes de pasto y construye su nido en forma de taza, forrado con plumas pequeñas. Pone de 5 a 8 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual, aunque la hembra emite sonidos diferentes al macho. Ambas fotografías corresponden a individuos adultos observados en el vado del Río Putana (12).

Crested Duck



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Pato puna

Anas puna



Fotografía: Aracelli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 45 - 49 cm. En Chile esta especie de pato se distribuye en la zona altiplánica, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Antofagasta. Habita lagos, lagunas, bofedales y ríos altoandinos entre los 3.000 y 4.500 m.s.n.m. Migra solo cuando se congelan las aguas y algunas veces es posible verlo en la costa. Se observa en grupos dispersos o grupos familiares y a menudo con otras especies de patos o taguas. Es de alimentación omnívora y busca su alimento en las orillas, en fondos fangosos o entre la vegetación flotante. Se reproduce entre septiembre y marzo, nidificando sobre islotes o nidos de taguas abandonados y escondiendo el nido entre el pasto largo. Pone de 5 a 6 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, la hembra es un poco más parda en su conjunto, especialmente los flancos. A la izquierda, una hembra y a la derecha, un macho. Ambas fotografías corresponden a individuos observados en el vado del Río Putana (12).

Puna Teal



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Guayata (Piuquén)

Oressochen melanopterus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 75 - 80 cm. La distribución en Chile de la guayata abarca desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región del Bío Bío (Ñuble). Es un ave típica de los bofedales altoandinos con abundante llareta o gramíneas, entre los 3.500 y 5.000 m.s.n.m. Es Confiada ante la presencia humana. De alimentación vegetariana, incluye pastos, juncos y plantas acuáticas tiernas, las que come principalmente en sectores húmedos fuera del agua. Nidifica desde noviembre a enero. Su nido, con forma de taza y cubierto con plumas, es construido en las laderas de cerros cercanos a lagunas. Pone de 8 a 19 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 16/2016, Ministerio del Medio Ambiente), y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual, el macho es mucho más grande que la hembra. A la izquierda, una pareja de adultos, el macho está de pie. A la derecha, una hembra. Ambas imágenes fueron tomadas en el vado del Río Putana (12).

Andean Goose



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Blanquillo común

Podiceps occipitalis juninensis



Fotografía: Roberto Villablanca Montaña

DESCRIPCIÓN: L. 27 cm. En Chile están presentes 2 subespecies de blanquillo, *juninensis* y *occipitalis*, ambas han sido registradas en la Región de Antofagasta. La subespecie *juninensis*, se distribuye solamente de la Región de Arica y Parinacota a la Región de Antofagasta, habitando principalmente lagunas cordilleranas entre los 3.500 y 4.500 m.s.n.m. Ocasionalmente puede ser observado en la zona costera. De hábitos solitarios o en grupos dispersos, siempre en el agua, vuela poco y es buen buceador. Durante la temporada reproductiva es más propenso a formar colonias y es característico que los polluelos se suban en la espalda de un adulto, donde descansan o esperan ser alimentados.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, una pareja de adultos observada en la Laguna Miscanti (24). A la derecha, un adulto nadando en Bolsico (43).

Silvery Grebe



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Blanquillo común

Podiceps occipitalis occipitalis



Fotografía: Ariel Silva Narváez

DESCRIPCIÓN: L. 27 cm. La subespecie *occipitalis*, es migradora y se distribuye principalmente desde Coquimbo hasta Tierra del Fuego. Habita lagos, ríos o lagunas hasta los 4.600 m.s.n.m., también es frecuente verlo en la zona costera. De hábitos solitarios, en parejas o en grupos pequeños. En el invierno forma bandadas que se posan en grandes masas de agua, a menudo en el mar. Nidifica en plataformas flotantes de vegetación, ancladas y muy ocultas. Es característico que los polluelos se suban en la espalda de un adulto, donde descansan o esperan ser alimentados.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos registrados en la bahía de Mejillones (40).

Silvery Grebe



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Huala

Podiceps major



Fotografía: Ariel Silva Narváez

DESCRIPCIÓN: L. 78 cm. Esta especie de zambullidor se distribuye preferentemente desde Copiapó hasta la zona centro sur de Chile, ocasionalmente se ha observado también en Arica y Mejillones. Habita lagos, lagunas, embalses, tranques y zonas costeras. De hábitos solitarios, en pareja o en grupos familiares. Muy territorial aunque comparte su hábitat con otras aves acuáticas. Durante el otoño e invierno forma bandadas. Se alimenta de peces pequeños, plantas e insectos acuáticos. Construye nidos flotantes con totoras y plantas que arranca del fondo. Pone de 4 a 6 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos nadando en la bahía de Mejillones (40).

Great Grebe



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Flamenco chileno

Phoenicopterus chilensis



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 95 - 105 cm. El flamenco chileno se distribuye en Chile de la Región de Arica y Parinacota a Tierra del Fuego. Se puede encontrar desde el nivel del mar hasta sobre los 5.000 m. de altitud, habitando una gran variedad de ambientes húmedos, especialmente zonas de aguas poco profundas dulces o saladas. De comportamiento gregario y desconfiado, es característico que para alimentarse recorra los cuerpos de agua hurgando con el pico hundido, mientras mueve sus patas para remover sedimento del fondo y así encontrar su alimento, el cual se compone de pequeños invertebrados y vegetales acuáticos. Nidifica en lagunas solitarias de aguas poco profundas y construye su nido con barro en forma de taza. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto fotografiado en la desembocadura del Río Loa (33). A la derecha, un adulto volando sobre el bofedal cerca de Machuca (13).

Chilean Flamingo



Fotografía: Roberto Villablanca Montaña

Parina chica

Phoenicoparrus jamesi



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 90 cm. La parina chica se distribuye en Chile desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Laguna del Negro Francisco en la cordillera de la Región de Atacama. Habita lagos y lagunas de la zona de la puna sobre los 3.500 m.s.n.m. Es gregaria, tímida y se alimenta principalmente de fitoplancton (diatomeas). Su reproducción la lleva a cabo entre diciembre y febrero. Nidifica en colonias junto al flamenco chileno y a la parina grande. Construye su nido con barro en forma de taza. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos observados en el Salar de Ascotán (6).

James's Flamingo



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Parina grande

Phoenicoparrus andinus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 110 cm. La parina grande se distribuye en Chile en la zona de la puna, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Laguna del Negro Francisco en la cordillera de la Región de Atacama, habitando lagunas salobres entre los 2.300 y 4.500 m.s.n.m. Es gregaria, tímida y se alimenta de fitoplancton (diatomeas). Su reproducción la lleva a cabo entre diciembre y febrero, nidificando en colonias junto al flamenco chileno y a la parina chica, en las partes bajas de lagos o lagunas solitarias. Construye su nido con barro en forma de taza. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 38/2015, Ministerio del Medio Ambiente) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos observados en el bofedal cerca de Machuca (13).

Andean Flamingo



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Pinguino de Humboldt

Spheniscus humboldti



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 65 cm. En Chile, el pingüino de Humboldt está restringido a la Corriente de Humboldt entre Arica y Chiloé. Es completamente acuático en todas sus rutinas de alimentación; su alimento es principalmente anchovetas, pejerreyes, sardinas, calamares y crustáceos. No se acerca a las playas, prefiere islotes y zonas escarpadas. Algunos individuos se reproducen durante el otoño, aunque la mayoría lo hace durante la primavera. Sus nidos son ubicados en cuevas o bajo rocas en islas e islotes cercanos a la costa. Sus colonias de reproducción son altamente vulnerables.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 50/2008, Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y también para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, una pareja de adultos y un juvenil (en primer plano), observados en los islotes de Punta Itata, al norte de Mejillones (38). A la derecha, un adulto en el Parque Nacional Pan de Azúcar (50).

Humboldt Penguin



Fotografía: Guillermo Luna Jorquera

Albatros de Buller

Thalassarche bulleri



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 80 cm. / E. 210 cm. La distribución del albatros de Buller está restringida al Océano Pacífico Sur entre Australia y la costa suroeste de Sudamérica, siendo eminentemente pelágico (alta mar). Habitualmente se acerca a la Corriente de Humboldt y ocasionalmente a la zona costera; sigue a los barcos pesqueros y se alimenta mayoritariamente de cefalópodos, peces y crustáceos. Nidifica en las Islas Snares y Chatham (Nueva Zelanda), formando colonias dispersas. Su nido es construido con hierbas, raíces y barro con una depresión central. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos inmaduros observados en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

Buller's Albatross



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Albatros de ceja negra

Thalassarche melanophris



Fotografía: Juan Menares Henríquez

DESCRIPCIÓN: L. 88 cm. / E. 224 cm. Este albatros es ampliamente distribuido en Chile. Habitualmente pelágico, aunque se acerca a la costa e islas. Se alimenta principalmente de peces y crustáceos; también de calamares y desperdicios arrojados desde barcos. Se reproduce en islas australes de los océanos Pacífico y Atlántico. Durante el periodo reproductivo la mayoría de los individuos migra hacia el sur, quedando solamente los inmaduros frente a las costas del norte y centro de Chile. Nidifica en colonias construyendo su nido de barro. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 38/2015, Ministerio del Medio Ambiente). *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un individuo inmaduro observado en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

Black-browed Albatross



Fotografía: Aldo Pacheco Valenzuela

Albatros de Salvin

Thalassarche salvini



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 95 cm. / E. 250 cm. El albatros de Salvin es principalmente pelágico (alta mar), aunque ocasionalmente llega a la costa sudamericana por la Corriente de Humboldt. Se acerca a los barcos en faenas pesqueras y se alimenta de peces y cefalópodos. Nidifica formando colonias en las Islas Bounty y Snares (Nueva Zelanda); su nido es construido con barro seco y plumas. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observados en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

Salvin's Albatross



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Fardela blanca

Ardenna creatopus



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 46 - 48 cm. / E. 109 cm. La fardela blanca es común en Chile. Se distribuye desde Arica hasta Chiloé, observándose principalmente mar adentro en torno a las islas donde se reproduce. Normalmente se desplaza en grupos y en algunas ocasiones es muy común verla frente a la costa continental. Es muy bulliciosa. Se acerca a los barcos atraída por las carnadas y faenas pesqueras. Se alimenta de anchovetas, además de calamares y pequeñas cantidades de crustáceos. Nidifica exclusivamente en Chile, en el Archipiélago de Juan Fernández e Isla Mocha. Su nido lo ubica en cuevas (túneles) de 2 a 3 metros de profundidad en zonas abruptas cerca del mar.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *En Peligro*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 50/2008, Ministerio Secretaría General de la Presidencia). *Vulnerable*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observados frente a la costa de Mejillones (40).

Pink-footed Shearwater



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Fardela de dorso gris

Ardenna bulleri



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 46 cm. / E. 97 cm. La fardela de dorso gris se distribuye solo en el Océano Pacífico. Visitante en Chile entre enero y marzo. En el mar, es gregaria y se acerca a los barcos en faenas de pesca. Se alimenta principalmente de peces, calamares y crustáceos pequeños que captura en la superficie del agua. Anida formando colonias densas, en las Islas Poor Knights cerca de Nueva Zelanda. El nido de tipo madriguera es construido bajo árboles, en grietas de rocas o en cuevas y forrado con hojas y ramas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observados frente a la costa de Mejillones (40).

Buller's Shearwater



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Fardela negra

Ardenna grisea



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 40 - 46 cm. / E. 94 - 104 cm. La fardela negra se encuentra prácticamente en todos los mares del mundo y, en Chile a lo largo de toda la costa. De hábitos gregarios, se agrupa en bandadas muy numerosas. Se caracteriza por su vuelo rasante, rápido y vigoroso que combina con planeos. Se acerca a faenas pesqueras en alta mar y vuela en forma circular en torno a los barcos y botes. Se alimenta de anchoas, además de jibias y crustáceos. En Chile, nidifica en Islas Guafo y Guamblin, islas del Cabo de Hornos y Tierra del Fuego. Su nido lo ubica en excavaciones en terrenos blandos y la entrada tapada por algún arbusto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto volando frente a la costa de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto volando en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

Sooty Shearwater



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Petrel de Nueva Zelanda

Procellaria westlandica



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 51 cm. / E. 137 cm. En Chile, el petrel de Nueva Zelanda se encuentra desde Arica hasta el extremo sur. Habita preferentemente aguas del Océano Pacífico Sur. De comportamiento gregario, se aproxima a otras especies de petreles o fardelas cuando se alimentan mar adentro. Su dieta se compone de cefalópodos, peces, crustáceos y desechos de barcos pesqueros. Nidifica en Nueva Zelanda a partir de mayo. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un individuo adulto observados en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

Westland Petrel



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Petrel gigante subantártico

Macronectes halli



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 81 - 94 cm. / E. 180 - 200 cm. Este petrel gigante, se distribuye en Chile de la Región de Antofagasta a la Península Antártica, asociado a aguas frías, canales australes y zonas costeras de la Corriente de Humboldt. Comparte su hábitat con otros petreles. Presenta hábitos de alimentación diferentes entre machos y hembras. Mientras que el macho normalmente se alimenta en tierra de cadáveres, (ej. focas, pingüinos o petreles), la hembra captura presas vivas en el mar (ej. krill o cefalópodos). Anida en las islas subantárticas y construye su nido con ramas, hierbas y otros vegetales. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos juveniles, a la izquierda, frente a la costa de Mejillones (40) y a la derecha, en La Rinconada (44).

Northern Giant-Petrel



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Petrel negro

Procellaria aequinoctialis



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 51 - 58 cm. / E. 134 - 147 cm. El petrel negro es de amplia distribución mundial, en Chile se distribuye de Arica al círculo polar antártico. Habita aguas subantárticas subiendo por la Corriente de Humboldt y, en ocasiones, se aproxima a la costa. Forma grupos dispersos o vuela solitario. Sigue a los barcos y su vuelo es de planeos espaciados y aleteo suave. Se alimenta principalmente de cefalópodos, crustáceos, peces pequeños, y a veces, de desperdicios de los barcos. Nidifica entre noviembre y diciembre en islas subantárticas como las Malvinas y algunas de Nueva Zelanda. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observados en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

White-chinned Petrel



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Petrel plateado

Fulmarus glacialoides



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 45 cm. / E. 120 - 130 cm. El petrel plateado se distribuye en Chile desde Arica hasta la Antártica. De hábitat pelágico principalmente en aguas frías. En invierno se desplaza hacia el norte siguiendo la Corriente de Humboldt. Se ve solitario o en grandes grupos y habitualmente se acerca a los barcos en faenas de pesca. Se alimenta preferentemente de crustáceos, peces pequeños, jibias e incluso carroña. Al alimentarse en grupo, muestra un comportamiento agresivo y dominante sobre otras especies de aves. Nidifica en el archipiélago antártico e islas cercanas en riscos altos e inaccesibles. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un individuo adulto observado en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

Southern Fulmar



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Yunco de Humboldt

Pelecanoides garnotii



Fotografía: Manuel Rojo Rojo

DESCRIPCIÓN: L. 20 - 24 cm. En Chile, el yunco de Humboldt se distribuye entre Arica y Corral, acercándose ocasionalmente a la zona costera. Generalmente se ve solitario, en pareja o formando pequeños grupos. Es común verlo descansando, flotando con su cola levantada. Se alimenta de peces pequeños (ej. sardinas y anchoas) y crustáceos. Se reproduce prácticamente todo el año, formando grandes colonias de nidificación en islotes; su nido lo construye en cavernas de las cuales entran y salen solo de noche, durante el día se mantienen en silencio. Pone solo 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *En peligro*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observados frente a la costa de Mejillones (40).

Peruvian Diving-Petrel



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Golondrina de mar chica

Oceanites gracilis



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 15 - 16 cm. En Chile, la golondrina de mar chica se distribuye en el Océano Pacífico, desde Arica hasta Valparaíso y siempre asociada a la Corriente de Humboldt. Es de vuelo liviano y errático. Activa de noche, es atraída por las luces de los barcos y también por las luces de las ciudades costeras, las cuales afectan su orientación obligándolas bajar a tierra. Se alimenta de peces pequeños y crustáceos. Nidifica, presumiblemente, en el norte de Chile en pequeños islotes, ubicando sus nidos en grietas naturales existentes en las rocas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Datos insuficientes (Insuficientemente conocida)*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura) y también para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observados frente a la costa de Mejillones (40).

Elliot's Storm-Petrel



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Golondrina de mar de collar

Oceanodroma hornbyi



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 21 - 23 cm. En Chile, la golondrina de mar de collar se distribuye en el Océano Pacífico, desde Arica hasta Valparaíso y siempre asociada a la Corriente de Humboldt. Es de vuelo errático y parece dar brincos sobre el agua. Activa de noche, es atraída por las luces de los barcos y también por las luces de ciudades costeras. La contaminación lumínica producida por estas ciudades, afecta negativamente el vuelo de las golondrinas, haciéndolas perder su rumbo y obligándolas bajar a tierra. Algunas veces, estos efectos pueden llegar a ser aún mayores, cuando producto del encandilamiento, las aves colisionan violentamente en contra de las luminarias. Los lugares de nidificación son difíciles de encontrar, aunque se ha registrado su nidificación al interior del desierto en la Región de Atacama.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Datos insuficientes (Insuficientemente conocida)*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura) y también para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imagenes corresponden a un individuo adulto encontrado, totalmente desorientado, en la vía pública de la ciudad de Antofagasta (47). Este individuo fue trasladado al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta y posteriormente, luego de su recuperación, liberado en la costa.

Ringed Storm-Petrel



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Piquero común

Sula variegata



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 74 cm. Piquero muy común y extendido en Chile. Se distribuye desde Arica hasta Chiloé. Es costero y siempre asociado a la Corriente de Humboldt. Generalmente se ve solitario o en pequeños grupos y algunas veces asociado con pelícanos, sin embargo se agrupa en grandes concentraciones en sus colonias reproductivas o cuando el alimento es abundante. Se alimenta principalmente de anchoas y de otros peces pequeños. Se caracteriza por su forma de cazar, acechando a su presa volando a media altura mirando hacia abajo, cuando la localiza se lanza en picada con las alas entreabiertas para luego adoptar una forma de flecha y sumergirse a gran velocidad para capturarla. Se reproduce entre enero y febrero. Nidifica en acantilados o islotes y su nido es a base de algas o simplemente desnudo, donde pone normalmente 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Datos insuficientes (Insuficientemente conocida)*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). **Preocupación menor**, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, una pareja en su nido con sus tres polluelos en el Islote de Punta Itata (norte de Mejillones) (38). A la derecha, un adulto volando por los acantilados del Monumento Natural La Portada (45).

Peruvian Booby



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Piquero de patas azules

Sula nebouxii



Fotografía: Charly Moreno Taucare

DESCRIPCIÓN: L. 80 - 85 cm. Piquero no muy común en Chile. Visitante ocasional asociado principalmente al Fenómeno El Niño. Se distribuye en aguas del Océano Pacífico desde México hasta Perú. En Chile hay registros de Arica a Coquimbo, incluidas las Islas San Félix y San Ambrosio. Se alimenta principalmente de anchoas, sardinas y caballas. Nidifica en grandes colonias en islotes o acantilados. Su nido es construido en el suelo, sin adornos, aunque rodeado por un círculo de fecas. Pone de 1 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un individuo juvenil descansando en los roqueríos en la zona del Club de Yates en la ciudad de Antofagasta (47).

Blue-Footed Booby



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Guanay

Phalacrocorax bougainvillii



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 76 cm. En Chile, este cormorán se distribuye desde Arica hasta Corral, siempre asociado a la Corriente de Humboldt. Exclusivamente marino y es común verlo en la costa e islas adyacentes. De comportamiento gregario, forma colonias muy densas en islas planas. Se desplaza en bandadas compuestas por muchos individuos en formaciones lineales o en “V”. Se alimenta de peces pequeños, especialmente anchoas y pejerreyes. Se reproduce durante todo el año, con un incremento notable entre noviembre y diciembre. Nidifica en superficies planas o levemente inclinadas. Su nido está construido en base a sus fecas, desechos y plumas. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos posados en los roqueríos de Punta Itata, al norte de Mejillones (38).

Guanay Cormorant



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Lile

Phalacrocorax gaimardi



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 76 cm. En Chile, el lile se distribuye desde Arica hasta Tierra del Fuego, es exclusivamente marino y siempre asociado a la costa. A menudo se ve en pareja o solitario y es silencioso. Se alimenta básicamente de peces y algunas veces come crustáceos, moluscos, poliquetos y algas. Se reproduce entre octubre y enero y anida en rocas, salientes de acantilados o bajo estructuras portuarias. Construye su nido con huiros y otros materiales (ej. redes de pesca, cordeles). Pone generalmente 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Datos insuficientes (Insuficientemente conocida)*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo adulto. A la derecha, un individuo juvenil y un adulto (detrás). Ambas imágenes corresponden a individuos observados en la costa de Mejillones (40).

Red-legged Cormorant



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Yeco

Phalacrocorax brasilianus



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 58 - 73 cm. En Chile, el yeco se distribuye a lo largo de toda la zona continental desde Arica hasta Tierra del Fuego. Ocupa preferentemente hábitats acuáticos, aunque no es exclusivamente marino; se puede encontrar tierra adentro en cuerpos de agua dulce. Nada con el cuerpo sumergido solo con el cuello sobre la superficie del agua. Se alimenta básicamente de peces, aunque a veces captura pequeños crustáceos. Nidifica en colonias, construye su nido con ramas, en acantilados, árboles o en el suelo. Es muy bullicioso en las colonias reproductivas. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo juvenil y a la derecha, un adulto en época reproductiva, la cual se distingue por las filoplumas blancas a los lados del cuello. Ambas imágenes corresponden a individuos observados en la costa rocosa de Coloso (48).

Neotropic Cormorant



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Pelícano común

Pelecanus thagus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 152 cm. En Chile, el pelícano común se distribuye entre Arica y Corral, asociado a la Corriente de Humboldt y siempre vinculado a la costa. Generalmente se ve solitario o en pequeños grupos, aunque se puede encontrar en grandes concentraciones en sus zonas de nidificación o cuando hay abundancia de alimento. Se alimenta principalmente de peces, los que captura lanzándose en picada al mar. Anida en islas e islotes costeros junto con otras aves marinas. Coloca de 2 a 3 huevos en nidos contruidos en el suelo y adornados con diferentes materiales como base.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo juvenil volando sobre la costa en la zona de Coloso al sur de Antofagasta (48). A la derecha, un individuo adulto volando en los acantilados del Monumento Natural La Portada (45).

Peruvian Pelican



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Garcita azulada

Butorides striata



Fotografía: Ariel Silva Narváez

DESCRIPCIÓN: L. 43 cm. La garcita azulada se distribuye en gran parte de América, desde el centro de Argentina hasta Estados Unidos. En Chile es un visitante ocasional que ha sido observado en varias localidades costeras entre Arica y Valparaíso. Habita bordes de lagos, lagunas, ríos, zonas pantanosas y totorales. De hábitos solitarios y no muy sociable con otras especies de garzas. De vuelo lento y pausado. Muy tímida. Se alimenta de peces, anfibios, insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos, lombrices y poliquetos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un individuo adulto observado en la localidad de Peine (25).

Striated Heron



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Garza azul

Egretta caerulea



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 56 cm. La garza azul se distribuye entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Coquimbo. Se encuentra en las costas rocosas, playas de arena y también tierra adentro, desde el nivel del mar hasta los 2.400 m. de altitud. Recorre aguas someras en busca de su alimento que se compone principalmente de animales acuáticos, aunque también se alimenta de arañas, lagartijas y grillos. Construye su nido en árboles cerca del agua. Pone de 4 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un adulto en la costa rocosa al sur de Antofagasta (47).

Little Blue Heron



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Garza bueyera

Bubulcus ibis



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 50 - 56 cm. La garza bueyera se distribuye en todo Chile, incluyendo Isla de Pascua, Archipiélago de Juan Fernández, Tierra del Fuego e islas al sur del Canal Beagle. Habita preferentemente praderas y campos agrícolas, bordes de lagunas, ríos o pantanos. De hábitos diurnos, y durante el crepúsculo se desplaza en bandadas que cruzan campos y ciudades. Se alimenta de insectos, lombrices, caracoles y, ocasionalmente, de lagartijas, mamíferos pequeños y polluelos de aves. Nidifica en primavera y verano, construyendo su nido en árboles o totorales. Pone de 2 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo juvenil observado en un parque en el sector sur de la ciudad de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto con su plumaje reproductivo en el Salar de Imilac (30).

Cattle Egret



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Garza chica

Egretta thula



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 56 - 66 cm. Garza ampliamente distribuida en Chile, ocupando diversos hábitats desde el nivel del mar hasta los 2.000 m. de altitud, tales como: orillas y partes bajas de ríos, lagos, lagunas, tranques, esteros, pantanos y zonas costeras. De comportamiento solitario o en grupos dispersos, es un ave confiada y silenciosa. Se alimenta de peces pequeños, anfibios, crustáceos, gusanos e insectos acuáticos. Se reproduce desde noviembre hasta diciembre. Nidifica en árboles, riscos o totorales. Pone 3 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en la costa sur de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto registrado en el Río Salado en las cercanías de Chiu Chiu (10).

Snowy Egret



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Garza cuca

Ardea cocoi



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 120 cm. En Chile, la garza cuca se distribuye desde la Región de Antofagasta hasta Tierra del Fuego, habitando orillas de lagos, lagunas, ríos, embalses, tranques y playas marinas. Generalmente se ve solitaria, rara vez en pareja, muy tímida, de vuelo pausado y elegante. De hábitos nocturnos, se alimenta de peces, larvas de insectos acuáticos y anfibios que caza a orillas del agua. Nidifica sobre los árboles y construye su nido con palos secos. Pone 2 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 16/2016, Ministerio del Medio Ambiente), y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos inmaduros observados en la zona del terminal pesquero de la ciudad de Antofagasta (47).

Cocoi Heron



Fotografía: Jorge Fuentes Figueroa

Garza grande

Ardea alba



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 85 - 105. Garza ampliamente distribuida en diversos hábitats acuáticos: ríos, esteros, lagunas, lagos o costa marina. Gregaria, se suele encontrar junto a la garza chica. Caza caminando pausadamente al acecho de sus presas, incluso al punto de quedarse completamente inmóvil. Se alimenta principalmente de camarones, peces y lagartijas. Nidifica entre la vegetación alta y espesa de lagos o lagunas, sus nidos son contruidos con palos pequeños secos, junco y totora. Pone entre 3 y 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imagenes corresponden a un adulto observado en el Río Loa en la localidad de Quillagua (34).

Great Egret



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Garza tricolor

Egretta tricolor



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 58 - 65 cm. Garza errante con registros en Arica, Antofagasta y Coquimbo. Habita generalmente a lo largo de la costa, marismas, manglares y canales de marea. También se puede observar en pantanos de agua dulce, ríos y lagos. Frecuenta sitios anegados y camina casi siempre con el cuello recogido en sus faenas de alimentación. Se alimenta de peces pequeños, crustáceos e insectos acuáticos. Construye sus nidos en arbustos o árboles bajos, aunque a veces nidifica en el suelo. Su nidada es de 2 a 3 huevos. No hay registros de nidificación en Chile.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto observado en la costa sur de Antofagasta (47).

Tricolored Heron



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Huairavo común

Nycticorax nycticorax obscurus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Black-crowned Night-Heron

DESCRIPCIÓN: L. 58 - 65 cm. En Chile existen 2 subespecies de huairavo. La subespecie *obscurus* se distribuye desde el extremo norte hasta Tierra del Fuego, habitando esteros, ríos, vegas y las zonas costeras. De hábitos crepusculares y nocturnos, aunque puede ser activo durante el día. De alimentación oportunista y dieta variada que se compone de peces, anfibios, crustáceos, insectos y lombrices. Se reproduce desde octubre a diciembre, nidifica en colonias o en solitario. Su nido, de palitos secos, lo ubica en los árboles. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo juvenil observado en la zona de Coloso (48). A la derecha, un individuo adulto observado en Antofagasta (47).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Cuervo de pantano de la puna

Plegadis ridgwayi

Puna ibis



Fotografía: Roberto Villablanca Montaña

DESCRIPCIÓN: L. 60 - 61 cm. En Chile, el cuervo de pantano de la puna se distribuye exclusivamente en la zona altiplánica entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta. Habita preferentemente lagos, lagunas y bofedales sobre los 3.500 m.s.n.m., pero regularmente baja a los humedales costeros (ej. desembocadura del Río Lluta, Arica). De comportamiento gregario, realiza desplazamientos estacionales, siendo abundante durante el invierno. Se alimenta de gusanos, insectos y larvas, los cuales busca introduciendo su pico en el terreno blando. Su nido es una plataforma de vegetación seca construida en juncos altos. Pone 1 a 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (DS 13/2013, Ministerio del Medio Ambiente). **Preocupación menor**, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2016).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos observados en el Salar de Carcote (5).



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Jote de cabeza colorada (Gallinazo)

Cathartes aura



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 62 - 76 cm. Esta especie de jote se distribuye ampliamente en Chile, de Arica al Cabo de Hornos habitando variados ambientes, desde la costa hasta los 2.000 m.s.n.m. Muy habitual en las ciudades costeras, en algunos casos es considerado como plaga. De hábitos gregarios, aunque sus vuelos son en solitario o en pareja. Vuela a baja altura rastreando el terreno en busca de alimento, que se compone principalmente de carroña. Es común verlo al interior de colonias de parición de lobos marinos o de nidificación de la gaviota garuma, alimentándose de restos orgánicos y también de huevos en el caso de la gaviota garuma. Nidifica en cuevas en los cerros y la postura de sus huevos comienza en septiembre. Usualmente pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observado en la zona de Bolsico, frente a la Isla Santa María (43).

Turkey Vulture



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Aguilucho común

Geranoaetus polyosoma



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 45 - 62 cm. El aguilucho común se distribuye de Arica a Tierra del Fuego, habitando todo tipo de ambientes: zonas abiertas, bordes de los bosques, sectores semiáridos con vegetación baja, serranías y ciudades, desde el nivel del mar hasta los 5.000 m. de altitud. Se puede observar en pareja o en grupos familiares. Se posa en postes, torres eléctricas, árboles y cercos al borde de los caminos, desde donde acecha a sus presas, aunque también lo hace desde el aire con planeos a media altura. Se alimenta de pequeños mamíferos, aves y reptiles. Construye sus nidos en variados sitios (ej. riscos o copa de los árboles). El nido es voluminoso y lo arma con palos secos. Pone normalmente 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, una hembra adulta posada en un pimiento en la localidad de Quillagua (34). A la derecha, un macho adulto volando a baja altura en la zona de la Laguna Inca Coya cerca del poblado de Chiu Chiu (9).

Variable Hawk



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Peuco

Parabuteo unicinctus unicinctus



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Harris's Hawk

DESCRIPCIÓN: L. 45 - 59 cm. / E. 92 - 121 cm. El peuco se distribuye entre Arica y Aysén. Ocupa una gran variedad de ambientes desde el nivel del mar hasta los 2.200 m. de altitud. Es posible observarlo asociado a terrenos abiertos, quebradas semidesérticas, laderas de cerros con arbustos. Solitario, en pareja o en grupos familiares. Tímido y silencioso. Generalmente se ve oculto en el follaje, desde donde acecha a sus presas. Se alimenta de animales vivos (ej. aves y roedores). Nidifica en árboles altos y densos. Construye un nido con ramas secas y forrado con lana. Usualmente pone 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un inmaduro observado en el Parque Juan López en Antofagasta (47).



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Pidén común

Pardirallus sanguinolentus simonsi



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 28 - 38 cm. En Chile se encuentran 3 subespecies de pidén común. La subespecie presente en la Región de Antofagasta se distribuye entre Arica y Antofagasta, habitando zonas húmedas, oasis y lagunas, desde el nivel del mar hasta los 3.000 m. de altitud. Se ve comúnmente en zonas abiertas con abundante vegetación y generalmente, solitario o en grupos familiares. Suele ocultarse entre la vegetación donde pasa inadvertido. Es tímido y de sentirse amenazado corre rápidamente, rara vez vuela. Tiene un canto fuerte. Construye su nido con pasto, donde pone de 4 a 7 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en Caspana (8). A la derecha, un adulto en las cercanías de Chiu Chiu (10).

Plumbeous Rail



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

Tagua andina

Fulica ardesiaca



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 40 - 46 cm. La tagua andina se distribuye entre Arica y Antofagasta, desde el nivel del mar hasta los 4.700 m. de altitud. Ocupa humedales con vegetación subacuática, aunque también es posible encontrarla en tranques y ríos a baja altura. Gregaria y más tímida que otras taguas presentes en el norte. En Chile se reproduce entre noviembre y enero, construye un nido flotante entre los juncos o a la vista. Tiene una nidada de 4 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos nadando en el Río Loa en las cercanías de la localidad de Quillagua (34).

Slate-colored Coot



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Tagua chica

Fulica leucoptera



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

White-winged Coot

DESCRIPCIÓN: L. 35 - 43 cm. La tagua chica se distribuye entre Arica y Tierra del Fuego y desde la zona costera hasta la alta cordillera. Siempre en ambientes acuáticos con abundantes plantas sumergidas: lagos, lagunas, remansos de ríos, pantanos. Es muy territorial, especialmente en época de cría. Durante el invierno es gregaria en grupos dispersos y con otras especies. Su alimento lo constituyen plantas acuáticas y semillas presentes en los bordes de las lagunas. La construcción de su nido depende del entorno, en las zonas bajas lo hace entre la vegetación o pajonales, mientras que en las zonas altas (cordillera), lo hace a la vista formando un nido flotante que lo ancla al fondo con los mismos vegetales acuáticos. Tiene una nidada de 4 a 9 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos observados en el Río Loa, cerca de Chiu Chiu (10).



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Tagua común

Fulica armillata



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 43 - 51 cm. La tagua común se distribuye desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud, habitando cualquier formación de agua dulce con o sin vegetación: pantanos, lagunas y lagos. Se puede reunir en grandes bandadas y compartir hábitat con otras taguas. Se alimenta en horas crepusculares de brotes de plantas acuáticas, tanto en el fondo como en la superficie. Rara vez vuela. Su reproducción es de octubre a diciembre y pone de 4 a 7 huevos en un nido flotante con forma de taza, que arma con junquillos y vegetación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto nadando en el Río Loa al noreste de Calama (11).


Red-gartered Coot



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tagua cornuda

Fulica cornuta



Fotografía: Nelson Amado Pool

DESCRIPCIÓN: L. 46 - 62 cm. La tagua cornuda se distribuye desde la Región de Tarapacá hasta la Región de Coquimbo, siendo más frecuente en la Región de Antofagasta. Se encuentra preferentemente en humedales cordilleranos sobre los 3.000 m. de altitud, en grupos dispersos, siendo muy territorial durante la época de reproducción. Se alimenta de vegetales acuáticos. El periodo reproductivo es entre octubre y febrero. Su nido es construido hacia el centro de las lagunas (islas) y apoyado en una base de piedras. Pone de 3 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 38/2015, Ministerio del Medio Ambiente) y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil. A la derecha, un adulto. Ambas imágenes corresponden a individuos observados en la Laguna Miscanti (24).

Horned Coot



Fotografía: Roberto Villablanca Montaña

Tagua de frente roja

Fulica rufifrons



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 36 - 43 cm. La tagua de frente roja se distribuye normalmente entre las regiones de Atacama y de Los Lagos. Ocasionalmente también se ha observado en Calama y en la desembocadura del Río Loa. Habita lagos y lagunas con abundante vegetación por las orillas, desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altitud. Se encuentra en parejas o grupos familiares. Tímida y permanece oculta aprovechando la vegetación circundante. Se alimenta de vegetales acuáticos. La postura de huevos es entre septiembre y octubre. Construye un nido principalmente con material vegetal, bien escondido y mucho más pequeño que el de sus congéneres. Pone de 2 a 9 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos adultos observados en la confluencia de los ríos Loa y San Salvador en Chacance (37).

Red-fronted Coot



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tagua gigante

Fulica gigantea



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Giant Coot

DESCRIPCIÓN: L. 48 - 64 cm. En Chile, la tagua gigante se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Antofagasta entre los 3.500 y 5.000 m.s.n.m., habitando lagos y lagunas con abundante vegetación subacuática. Es gregaria, aunque muy territorial en torno a su nido. Es posible ver a varias parejas compartiendo una misma extensión de agua. Pone huevos dos veces al año y su nido construido de material vegetal, es usado año tras año, pudiendo llegar a cubrir una superficie de 6 metros cuadrados.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil y a la derecha, un adulto, ambos individuos observados en el vado del Río Putana (12).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Tagüita del norte

Gallinula galeata pauxilla



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 30 - 38 cm. En Chile existen 2 subespecies de tagüita del norte. La subespecie en la Región de Antofagasta se distribuye desde las zonas bajas de Arica hasta el Río Loa, habitando principalmente cuerpos de agua dulce (ríos, lagunas, estuarios). Es menos agresiva, más bien tímida comparada con otras taguas. De alimentación omnívora y oportunista. Su dieta consiste en lombrices, crustáceos, moluscos, larvas de insectos, arañas, peces pequeños, algas, semillas y plantas acuáticas. El nido puede variar desde una superficie poco profunda a una copa profunda; es construido con ramas o vegetación y ubicado en la orilla cerca del agua o flotante.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil observado en la desembocadura del Río Loa (33). A la derecha, un adulto en la cercanía de Chiu Chiu (10).

Common Gallinule



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Chorlo de campo

Oreopholus ruficollis



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 25 - 29 cm. El chorlo de campo se distribuye entre Arica y Tierra del Fuego. Se puede observar en tierras abiertas, pajonales, terrenos muy pedregosos y secos hasta los 4.500 m.s.n.m. Siempre se ve en grupos durante el invierno y durante el verano en parejas. Confía mucho en su mimetismo y se desplaza rápidamente caminando o corriendo con la cabeza baja. Ante el peligro, se posa muy erguido mostrando su plumaje críptico del dorso. Cuando es perseguido vuela rápido a baja altura. Se alimenta presumiblemente de insectos. El nido es una depresión en el sustrato, donde coloca hasta 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en el Parque Nacional Llullaillaco (31). A la derecha, un adulto en las cercanías del poblado de Toconao (17).

Tawny-throated Dotterel



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Chorlo dorado

Pluvialis dominica



Fotografía: Jorge Fuentes Figueroa

DESCRIPCIÓN: L. 24 - 28 cm. Este chorlo migra desde el hemisferio norte durante la primavera austral y se distribuye entre Arica y Llanquihue. Habita las costas marinas y humedales del interior, aunque también se ha registrado su presencia en humedales altoandinos en el extremo norte. Generalmente se observa en pareja o en pequeños grupos, algunas veces se asocia con otras aves litorales. Es muy tímido. Se alimenta de insectos, gusanos, moluscos y crustáceos, también lo hace de bayas y semillas. Nidifica en la tundra del hemisferio norte. El nido es una depresión expuesta forrada con líquenes, musgos y hojas. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un adulto observado en la costa rocosa de Antofagasta (47).

American Golden-Plover



Fotografía: Jorge Fuentes Figueroa

Chorlo de la puna

Charadrius alticola



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 17 - 18 cm. El chorlo de la puna se distribuye en zonas de la puna de Arica a Copiapó, encontrándose en orillas de lagos, lagunas y zonas pantanosas, entre los 2.500 y 5.000 m.s.n.m. Se ve solitario o en grupos dispersos y recorre grandes extensiones de barro salino desplazándose rápidamente en busca de su alimento, que consiste en pequeños crustáceos. Nidifica en una depresión en el suelo pedregoso, donde sus huevos se mimetizan perfectamente.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil. A la derecha, una hembra (los machos son un poco más coloridos), ambos individuos observados en el Salar de Ascotán (6).

Puna Plover



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Chorlo nevado

Charadrius nivosus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 15 cm. El chorlo nevado se distribuye entre Arica y Llanquihue. Es costero, habitando principalmente playas de arena. Se puede observar en pareja o en grupos dispersos. Cuando se siente amenazado escapa caminando rápido y siempre atento a los movimientos del intruso, pero cuando la presión es muy evidente vuela con aleteo vigoroso y a baja altura. Se alimenta de pulgas de mar que captura en la retirada de las olas, corriendo velozmente sobre la arena con el cuerpo medio agachado. El nido es una depresión en la arena, tipo taza adornada con conchillas, ubicado cerca de la orilla del mar, pero suficientemente alejado del alcance de la marea alta. Pone generalmente de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en Bolsico (43). A la derecha, un adulto en Chipana, en el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta (32). Ambos adultos presentan plumaje reproductivo.

Snowy Plover



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Chorlo semipalmado

Charadrius semipalmatus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 17 - 19 cm. El chorlo semipalmado es un visitante de verano que se distribuye entre Arica y Chiloé y desde el nivel del mar hasta los 500 m. de altitud, encontrándose en costas marinas, orillas de lagos y lagunas interiores. Es gregario y muchas veces se ve junto con otras especies. Se alimenta principalmente de poliquetos, moluscos, crustáceos pequeños e insectos. El nido es una depresión poco profunda en zonas de arena o grava con vegetación escasa. Su nidada es de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a dos adultos observados en las playas rocosas del sector sur de Antofagasta (47).

Semipalmated Plover



Fotografía: Jorge Fuentes Figueroa

Chorlo cordillerano

Phegornis mitchellii



Fotografía: Marcos Cortés Araya

Diademed Sandpiper-Plover

DESCRIPCIÓN: L. 16 - 19 cm. En Chile, el chorlito cordillerano se distribuye de Arica a Curicó, habitando lagos, lagunas y zonas inundadas altoandinas, entre los 2.400 y 5.000 m.s.n.m. Generalmente se ve solo o en pareja. Muy confiado en su mimetismo, prefiere desplazarse caminando ante las amenazas. Es un ave particularmente discreta. Se alimenta de insectos acuáticos. Nidifica cerca del agua en una depresión en el pasto y la postura de huevos es entre octubre y diciembre.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda un adulto observado en las Vegas de Tumbres (21). A la izquierda, un adulto en las cercanías de la localidad de Machuca (13).



Fotografía: Valeria Lopes Martins

Queltehue común

Vanellus chilensis



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 36 cm. El queltehue común normalmente se distribuye entre Copiapó y Chiloé, aunque en los últimos años es posible observarlo en la ciudad de Antofagasta. Puede ser encontrado desde el nivel del mar hasta los 2.600 m. de altitud, en terrenos llanos y húmedos, parques al interior de las ciudades, tierras agrícolas, playas rocosas y fangosas. Es de alimentación básicamente insectívora, pero también se alimenta de semillas. Se puede ver en pareja, grupos dispersos y rara vez forma bandadas. Su voz es estridente e inconfundible. Es en extremo prudente y frente a cualquier amenaza exhibe una serie de conductas distractoras y de alerta. Cuando tiene huevos o polluelos arremete con vuelos en picada ante cualquier intruso. Vuela y canta de noche con mucha frecuencia. Nunca se posa sobre los árboles. Su reproducción comienza en invierno (julio) y nidifica en una depresión en el suelo que suele cubrir con algunos pastos secos. Las crías se mimetizan muy bien con el entorno.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos observados en el sector sur de la ciudad de Antofagasta (47).

Southern Lapwing



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Queltehue de la puna

Vanellus resplendens



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 32 cm. El queltehue de la puna se distribuye en la alta cordillera desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Antofagasta, entre los 3.500 y 5.000 m.s.n.m., habitando pastizales cerca de ríos y lagunas. En invierno algunos individuos se desplazan a zonas más bajas. Se puede ver solitario, en pareja o grupos dispersos. Su voz es estridente, a modo de alarma. El nido es una leve depresión en el suelo acondicionado con restos vegetales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil. A la derecha, un adulto. Ambas fotografías corresponden a individuos observados en la localidad de Amincha, cerca de Ollagüe (3).

Andean Lapwing



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Pilpilén común

Haematopus palliatus



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 40 - 44 cm. El pilpilén común se encuentra entre Arica y Chiloé, habitando zonas costeras, playas de arena, de rocas e islotes. Se ve en pareja o grupos numerosos y emite una llamativa voz cuando levanta el vuelo o frente a las amenazas. Es una especie muy impactada por la destrucción de las playas y dunas costeras donde nidifica. Es común verlo con otras especies de aves marinas descansando. Se alimenta de ostras, choros, caracoles, lapas, cangrejos en las playas de rocas y de pulguillas y poliquetos en playas de arena. Se reproduce entre octubre y diciembre. Su nidada es de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la playa de Punta Itata (38). A la derecha, un adulto en una playa al sur de Antofagasta (47).

American Oystercatcher



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Pilpilén negro

Haematopus ater



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 43 - 45 cm. El pilpilén negro se distribuye en Chile desde Arica hasta el Cabo de Hornos, habitando zonas costeras, playas de arena, de rocas e islotes. Se puede observar en pareja o en grupos familiares luego del nacimiento de sus polluelos. Su colorido lo hace casi imperceptible en ambientes rocosos. Se alimenta principalmente de choritos y lapas. Nidifica sobre las rocas o en playas de piedrecillas y conchuelas. Pone entre 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en una de las playas rocosas de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto en la playa La Rinconada, cerca de Antofagasta (44).

Blackish Oystercatcher



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Caití

Recurvirostra andina



Fotografía: Aracelli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 45 cm. El caití se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama, habitando lagos, salares y bofedales del altiplano, usualmente sobre los 3.500 m.s.n.m. Generalmente se ve en pareja o grupos pequeños. Se alimenta de insectos acuáticos y pequeños crustáceos, los que captura en aguas poco profundas sumergiendo levemente el pico y moviendo la cabeza lateralmente de lado a lado. Es muy tímido y casi siempre comparte su hábitat con los flamencos. Nidifica en los bordes de los lagos; su nido es rudimentario, hecho en el suelo asociado a vegetación pequeña. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Las fotografías corresponden a adultos en el Salar de Ascotán (6).

Andean avocet



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Batitú

Bartramia longicauda



Fotografía: Marcos Cortés Araya

DESCRIPCIÓN: L. 31 cm. El batitú es un ave errante en Chile. Migra desde el hemisferio norte hacia el sur, principalmente a Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Chile ha sido registrado solo en las áreas cordilleranas de Arica, Antofagasta, Atacama, Santiago y también en la Isla Decepción en la Antártica. Habita tierras interiores semiáridas con abundante vegetación baja y vegas andinas. Recorre los campos en busca de invertebrados. Acostumbra a correr rápido para detenerse abruptamente muy erguido observando sobre la hierba. También vuela rápido y se posa en sitios altos como rocas o postes, desde donde observa el entorno. Se alimenta de insectos terrestres, arañas, gusanos, caracoles y semillas. Nidifica en el centro de Estados Unidos y sur de Canadá. El nido es ubicado bien escondido entre la hierba alta, donde pone normalmente 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto observado en el Salar de Tara (20).

Upland Sandpiper



Fotografía: Marcos Cortés Araya

Becasina de la puna

Gallinago andina



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 23 cm. La becasina de la puna se distribuye en la zona de puna desde Arica hasta Antofagasta, entre los 2.000 y 5.000 m.s.n.m., habitando humedales y bofedales de las zonas altas. Generalmente se observa solitaria o en pareja y se mueve altitudinalmente; en el invierno se desplaza hacia Argentina y Bolivia. Se alimenta de invertebrados (ej. insectos y lombrices).

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto observado en el poblado de Kosca (1).

Puna Snipe



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Pitotoy grande

Tringa melanoleuca



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 29 - 33 cm. El pitotoy grande es un visitante en la temporada estival austral y se distribuye de Arica a Tierra del Fuego. Se encuentra en desembocaduras de ríos, vegas, pantanos, incluso humedales a grandes altitudes. Solitario o en pequeños grupos. Muy tímido y huye ante cualquier alteración del entorno. Se alimenta de insectos acuáticos y terrestres, larvas y crustáceos pequeños. Se reproduce en el hemisferio norte (Alaska y Canadá), migrando al sur al comienzo del invierno boreal.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en el Río Loa en la zona de Quillagua (34). A la derecha, un adulto en el bofedal cerca del pueblo de Machuca (13).

Greater Yellowlegs



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Playero blanco

Calidris alba



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 29 - 31 cm. El playero blanco es un visitante de verano que se distribuye de Arica a Magallanes, principalmente en las zonas costeras. Es gregario en todas sus rutinas. Vuela en grupos compactos a baja altura aunque también corre rápidamente tras las olas, siguiendo sus movimientos sin dejar que el agua lo toque. Descansa en grupos en playas de arena. Se alimenta de pequeños moluscos, crustáceos, gusanos, poliquetos e insectos. Se reproduce en el hemisferio norte y su nido es una leve depresión en la superficie del terreno. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos de playero blanco en playas de rocas en la costa de Antofagasta (47).

Sanderling



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Playero de ala blanca (Playero grande)

Tringa semipalmata

Willet

DESCRIPCIÓN: L. 33 - 41 cm. El playero grande se reproduce en el hemisferio norte y migra al hemisferio sur durante el verano. En Chile, se distribuye desde Arica hasta Chiloé, habitando playas de zonas costeras y desembocaduras de ríos. De movimientos pausados, acostumbra a asociarse a otras aves costeras (ej. pilpilenes o zarapitos); a veces forma grandes bandadas. Se alimenta de cangrejos pequeños, moluscos e insectos marinos. Se reproduce en colonias, a menudo dispersas, entre abril y junio. Construye su nido en la arena y pone 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto en la playa de Mejillones (40).



Fotografía: Ariel Silva Narváez



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Playero de Baird

Calidris bairdii



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 17 - 19 cm. Visitante de verano que se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta Magallanes. Se observa generalmente en pequeños grupos en los humedales altoandinos y lagunas poco profundas, en ocasiones, también se puede ver en la costa. Recorre el terreno picoteando la superficie en busca de insectos, arácnidos y crustáceos. Se reproduce en la tundra ártica y su nido es una depresión en el suelo adornada con vegetales o líquenes. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la costa rocosa de la ciudad de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto en el Salar de Ascotán (6)

Baird's Sandpiper



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Playero de las rompientes

Calidris virgata



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 23 - 25 cm. El playero de las rompientes es un visitante de verano que se distribuye en zonas de rocas entre Arica y Magallanes, siempre cerca de las rompientes de las olas. Habitualmente se observa en grupos pequeños o solitario, y normalmente se ve asociado con individuos de playero vuelvepedras. Busca su alimento caminando entre las rocas cerca de las rompientes y vuela para esquivar las olas cuando revientan. Se reproduce en el hemisferio norte; su nido es una pequeña depresión en el sustrato cubierto de líquenes.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto con algunos matices de plumaje reproductivo. A la derecha, adultos en época no reproductiva. Ambas fotografías corresponden a individuos observados en playas de rocas en la costa de Antofagasta (47).

Surfbird



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Playero de patas largas

Calidris himantopus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 20 - 23 cm. El playero de patas largas es un visitante casual de verano con registros principalmente en la costa entre Arica y Valparaíso, incluyendo playas arenosas, desembocaduras de ríos y lagunas costeras. También registrado en humedales altiplánicos. Habitualmente se observa solitario o en grupos pequeños; se asocia con otras aves playeras. Se alimenta de insectos, larvas, caracoles y semillas. Debido al largo de sus patas, debe inclinarse mucho mientras se alimenta. Se reproduce en el hemisferio norte; su nido es una depresión sobre un montículo en la tundra seca. Pone 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto con matices de plumaje nupcial en la desembocadura del Río Loa (33).

Stilt Sandpiper



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Playero pectoral

Calidris melanotos



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 19 - 24 cm. El playero pectoral también es un visitante de verano que migra desde el hemisferio norte. En Chile, se encuentra desde Arica hasta Llanquihue, habitando humedales interiores, pastizales y campos abiertos, inclusive la zona de la puna entre los 3.500 y 4.500 m.s.n.m.; a veces también se observa en la costa. Generalmente solitario o en pequeños grupos, vuela en zigzag emitiendo un trino breve. Se alimenta de arácnidos, insectos, crustáceos, moluscos y también de algas y semillas. Nidifica en el Ártico entre junio y julio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imagenes corresponden a un adulto en la zona de Quillagua (34).

Pectoral Sandpiper



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Playero semipalmado

Calidris pusilla



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 13 - 15 cm. El playero semipalmado es un visitante esporádico de verano que se distribuye entre Arica y San Antonio, habitando principalmente costas marinas, estuarios o desembocaduras de ríos. Recorre las riberas de los cuerpos de agua en pareja o pequeños grupos y también se asocia con otros playeros. Se alimenta de larvas, caracoles, moluscos, insectos, arácnidos y semillas. Se reproduce en el hemisferio norte entre junio y julio. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en Bolsico (43). A la derecha, un adulto en la costa de Antofagasta (47).

Semipalmated Sandpiper



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Playero vuelvepiedras

Arenaria interpres



Fotografía: Charly Moreno Taucare

DESCRIPCIÓN: L. 21 - 25 cm. El playero vuelvepiedras migra desde el hemisferio norte y se distribuye en Chile entre Arica y Llanquihue. Habita principalmente playas de arena y rocas y se observa en grupos pequeños, habitualmente asociado a otras aves (ej. playero de las rompientes). Para alimentarse, recorre las playas volteando pequeñas piedras con un rápido movimiento de cabeza y pico, capturando a los organismos que se ocultan debajo (ej. crustáceos, moluscos, insectos). Se reproduce en el hemisferio norte (Ártico) y su nido es una depresión sobre un montículo de tierra donde pone de 2 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto con plumaje reproductivo en la zona costera de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto con plumaje no reproductivo en Punta Itata (38).

Ruddy Turnstone



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Pollito de mar rojizo

Phalaropus fulicarius



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 20 - 22 cm. El pollito de mar rojizo es un ave migratoria que aparece en Chile durante las temporadas de primavera y verano. Se distribuye en alta mar frente a las costas de Arica a Chiloé. Generalmente vuela en bandadas por rutas oceánicas y algunas veces se acerca a la costa. Durante la época no reproductiva se alimenta de plancton. Se reproduce en la tundra ártica y durante esta época su plumaje cambia notoriamente a rojizo con negro. La postura de sus huevos ocurre entre junio y julio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, durante la época reproductiva el macho es más apagado que la hembra. Las fotografías corresponden a un adulto con su plumaje de reposo (no reproductivo), en la costa de Mejillones (40).

Red Phalarope



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Pollito de mar tricolor

Phalaropus tricolor



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 22 - 24 cm. El pollito de mar tricolor es otra de las aves que migra desde el hemisferio norte y visitan Chile durante las temporadas de primavera y verano. Se distribuye entre Arica y Tierra del Fuego, desde el nivel de mar hasta los 5.000 m. de altitud, prefiriendo lagos y lagunas salinas, tanto en el altiplano como en la Patagonia. Su alimento lo constituyen pequeños crustáceos, insectos y larvas. Gregario, en ocasiones se pueden observar a numerosos individuos en aguas interiores. Se reproduce entre mayo y junio en los Estados Unidos y Canadá.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, la hembra durante la época reproductiva tiene la corona (cabeza) casi blanca. A la izquierda, un adulto con plumaje no reproductivo en el bofedal en la zona de Machuca (13). A la derecha, un adulto en plumaje reproductivo observado a principio del otoño cerca de la localidad de Caspana (8).

Wilson's Phalarope



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Zarapito común

Numenius phaeopus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 45 cm. El zarapito común uno de los visitantes de verano más abundante en Chile. Se distribuye desde el extremo norte hasta Tierra del Fuego, habitando playas marinas, estuarios y desembocaduras de ríos. Aunque su número se incrementa en los meses de primavera y verano, es muy frecuente ver a individuos solitarios durante el invierno. Se alimenta de pulgas de mar u otros crustáceos, larvas y lombrices. Nidifica en la tundra ártica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos en la zona de Coloso (48).

Whimbrel



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Perdicita cojón

Thinocorus orbignyianus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 21 - 24 cm. Esta perdicita se distribuye desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego, entre los 500 y 5.000 m. de altitud, habitando zonas de matorrales de la alta cordillera, bofedales andinos, y bordes húmedos y herbáceos de arroyos. Se encuentra en pareja o grupos dispersos y, como todos sus congéneres, es de difícil observación, dada la coloración de su plumaje y los ambientes donde vive. Se alimenta de semillas y pastos verdes. Construye su nido en la hierba u otra vegetación, generalmente cerca del agua. Pone 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

A la izquierda, una hembra. A la derecha, un macho. Ambas fotografías corresponden a individuos observados en el bofedal cerca del poblado de Machuca (13).

Grey-breasted Seedsnipe



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Perdicita común

Thinocorus rumicivorus rumicivorus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 16 - 19 cm. La perdicita común se distribuye desde Antofagasta hasta Tierra del Fuego, ocupando una amplia variedad de hábitats, prefiriendo zonas planas y secas, terrenos áridos y pedregosos con vegetación baja. Específicamente en la Región de Antofagasta se encuentra sobre los 2.800 m.s.n.m. Es un ave gregaria que generalmente se mueve en bandadas y, aunque es buena voladora, ante el peligro prefiere alejarse caminando ocultándose en la escasa vegetación, confiando en su críptico plumaje. Se alimenta principalmente de brotes, hojas de hierbas y semillas. Generalmente nidifica en grupos y su nido es una depresión hecha en el suelo arenoso. Su nidada es de 2 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

A la izquierda, una hembra; a la derecha, un macho. Esta pareja fue fotografiada en la parte baja de los cerros Pajonales, al sur del Salar de Atacama (28).

Least Seedsnipe



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Perdicita cordillerana

Attagis gayi



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 29 - 31 cm. La perdicita cordillerana se distribuye entre Arica y Magallanes sobre los 3.500 m.s.n.m., encontrándose en cuevas rocosas, bofedales y terrenos pantanosos al fondo de los valles. Se ve en pareja o pequeños grupos familiares y en invierno forma bandadas. Frente al peligro, se agacha y se queda quieta confiando en su plumaje que se confunde con el entorno, sin embargo, cuando tiene que huir lo hace caminado para después emprender el vuelo. Se alimenta casi exclusivamente de semillas, fragmentos de plantas espinosas y suculentas. Su nido es construido como una simple depresión en el suelo, al lado de matas de vegetación en áreas de vegas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 16/2016, Ministerio del Medio Ambiente) y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos observados en la Laguna Lejía (22).

Rufous-bellied Seedsnipe



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Gaviota andina

Chroicocephalus serranus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 48 cm. La gaviota andina se distribuye desde Arica hasta Ñuble, siendo más escasa hacia el sur. Asociada principalmente a la alta cordillera, es frecuente verla en lagos, ciénagas y otros humedales en altura entre los 3.000 y 5.000 m.s.n.m. En invierno algunos individuos bajan a la zona costera. Más bien solitaria, aunque algunas veces se reúne en grupos, pero no forma grandes bandadas. Su alimento lo componen gusanos, insectos, anfibios, peces pequeños y también huevos de aves acuáticas. Se reproduce exclusivamente en las lagunas de la alta cordillera. Construye un nido flotante con plantas acuáticas; también nidifica en suelo, en rocas o pequeños islotes. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto con plumaje no reproductivo. A la derecha, un adulto con plumaje reproductivo (cabeza con capucha negra y ojos con pequeñas medias lunas blancas). Ambos individuos fueron observados en el poblado de Machuca (13).

Andean Gull



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Gaviota de Franklin

Leucophaeus pipixcan



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 38 - 43 cm. La gaviota de Franklin es visitante de verano, siendo la única gaviota que migra desde un hemisferio al otro. Se distribuye entre Arica y Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 500 m. de altitud y es posible observarla en costas, lagos, desembocaduras de ríos y basurales. Gregaria, se reúne en grandes bandadas y se asocia a otras especies durante su época de reposo. Se alimenta de insectos que caza en el aire o en el suelo y también de animales marinos de superficie. Nidifica en el hemisferio norte, al interior del oeste norteamericano. No hay registros de nidificación en Chile.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a individuos con plumaje no reproductivo. A la izquierda, un adulto en la zona costera de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto volando en la zona de Mejillones (40).

Franklin's Gull



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Gaviota de las Galápagos

Creagrus furcatus



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 55 - 60 cm. En Chile, esta gaviota se distribuye desde Arica hasta Valparaíso y es mucho más abundante durante el Fenómeno El Niño (aguas cálidas). Es principalmente pelágica (alta mar) y ocasionalmente costera. De hábitos nocturnos; durante la época no reproductiva realiza migraciones desde las Islas Galápagos hacia el sur. Se alimenta de calamares que captura en la noche, cuando éstos suben a la superficie; también se alimenta de peces pequeños.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil con su característico pico totalmente negruzco. A la derecha, un adulto mostrando algo de plumaje reproductivo (cabeza negra apizarrada). Ambas imágenes corresponden a individuos observados en alta mar frente a la costa de Mejillones (40).

Swallow-tailed Gull



Fotografía: Juan Menares Henríquez

Gaviota dominicana

Larus dominicanus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 58 cm. En Chile, la gaviota dominicana se distribuye entre Arica y el Cabo de Hornos, encontrándose en la zona costera y en ríos al interior. Es la gaviota más común y extendida en Chile. Solitaria o en bandadas. Busca su alimento tierra adentro en las zonas urbanas (ej. basurales), pero prefiere la zona costera. Su alimentación en la costa es variada (ej. peces, moluscos, crustáceos y desperdicios de alimentos arrojados al mar). Una de sus conductas más características es tomar un bivalvo con el pico, volar con él y luego soltarlo para quebrar su concha y poder comerlo. También depreda sobre huevos o pollos de otras aves marinas. Nidifica en diferentes sitios, pero prefiere zonas planas en islas o acantilados costeros. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil (1 año) en las rocas costeras del sector de Coloso (48). A la derecha, un adulto en la costa de Antofagasta (47).

Kelp Gull



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Gaviota garuma

Leucophaeus modestus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 46 cm. En Chile, la gaviota garuma se distribuye entre Arica y Valdivia, aunque durante las temporadas de primavera y verano restringe su distribución al norte grande del país. Gregaria, se agrupa en grandes bandadas en las playas de arena o rocas. Se alimenta principalmente de pulgas de mar y peces pequeños. Se reproduce durante la primavera y verano y los individuos maduros sexualmente tienen su cabeza blanca. La nidificación la lleva a cabo en el Desierto de Atacama hasta 100 km. tierra adentro. El nido es una leve depresión hechas en el sustrato, sin ningún adorno. Pone de 1 a 2 huevos y, en ocasiones hasta 3. Ambos padres se alternan en la incubación y posteriormente, en la crianza; mientras un padre está en el desierto, el otro está en la costa alimentándose y volverá a la colonia de nidificación durante la noche a reemplazarlo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto con plumaje no reproductivo (invierno) en la playa de Punta Itata (38). A la derecha, una pareja con plumaje reproductivo en la costa rocosa de Antofagasta (47).

Gray Gull



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Gaviota peruana

Larus belcheri



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 51 cm. La gaviota peruana se encuentra en Chile desde Arica hasta Coquimbo, habitando playas de rocas y arena, puertos y ciudades costeras. Sedentaria, forma bandadas pequeñas. No se aventura tierra adentro ni remonta ríos. Se alimenta de pequeños peces, crustáceos y moluscos. También depreda sobre huevos de otras especies. Nidifica en las zonas bajas de rocas e islotes, casi a ras del agua. Pone generalmente 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda un adulto, con su plumaje no reproductivo (otoño e invierno). A la derecha, un adulto con plumaje reproductivo (primavera y verano); nótese el cambio de color del plumaje de sus cabezas. Ambas fotografías fueron tomadas en el área de Coloso (48).

Belcher's Gull



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Gaviotín chico

Sternula lorata



Fotografía: Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico

DESCRIPCIÓN: L. 23 cm. El gaviotín chico se distribuye en la costa entre Arica y Antofagasta, asociado a la Corriente de Humboldt. Se acerca a la costa solo en períodos de reproducción pasando el resto del tiempo en alta mar, donde descansan sobre objetos flotantes. No es muy gregario. Se alimenta principalmente de peces y crustáceos. Nidifica en la Península de Mejillones y áreas cercanas. Las zonas de reproducción son espacios abiertos no muy protegidos ubicados entre 1 y 2 km. tierra adentro. El nido es una leve depresión hecha en el sustrato, sin ningún adorno. Pone de 1 a 2 huevos muy crípticos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *En Peligro*, según el Reglamento de Clasificación de las Especies Silvestres (DS 151/2007, Ministerio Secretaría General de la Presidencia), y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un par de polluelos de aproximadamente una semana de edad. A la derecha, un adulto incubando dos huevos. Ambas imágenes fueron tomadas en la pampa de Mejillones en la zona de Playa Grande (39).

Peruvian Tern



Fotografía: Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico

Gaviotín elegante

Thalasseus elegans



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 40 - 43 cm. Esta especie de gaviotín es un visitante de verano que se distribuye desde Arica hasta Puerto Montt. Se encuentra en el borde costero y algunas veces asociado a las desembocaduras de ríos. Gregario, forma grandes bandadas que se reúnen para descansar y a veces se asocia con otras especies (ej. gaviota garuma, gaviotín monja). Se alimenta de peces pequeños (ej. anchoveta) y también de invertebrados. Como parte de su estrategia de alimentación vuela con el pico apuntando hacia abajo y se clava cuando divisa su presa. Se reproduce en el hemisferio norte. Nidifica en áreas rocosas planas y pone normalmente 1 huevo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi Amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto posado en el sector de Punta Itata (38). A la derecha, un adulto volando en la costa de Antofagasta (47).

Elegant Tern



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Gaviotín monja

Larosterna inca



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 41 cm. El gaviotín monja se distribuye entre Arica y Corral. Costero y muy asociado a la Corriente de Humboldt, se posa en rocas, acantilados o estructuras hechas por el hombre (ej. bajo los muelles). Ave gregaria que no realiza vuelos migratorios, sólo se desplaza si hay escasez de alimentos. Se alimenta principalmente de anchovetas y otros peces pequeños, también de despojos de pescados arrojados al mar en las caletas o de barcos pesqueros. Anida preferentemente en grietas, cavidades entre las rocas o excavaciones hechas por otras aves, también lo hace en estructuras portuarias. Pone de 1 a 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto volando en la zona de La Rinconada (44). A la derecha, un adulto en los acantilados de Bandurria (42).

Inca Tern



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Gaviotín sudamericano

Sterna hirundinacea



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 40 - 44 cm. Gaviotín muy extendido en Chile. Se distribuye desde Arica hasta Tierra del Fuego. Asociado al borde costero, bahías protegidas y desembocaduras de ríos. Gregario. Forma grandes grupos, aunque se puede ver solitario. Se alimenta de peces pequeños, los que captura lanzándose sobre ellos en picada. En ocasiones también se alimenta de pequeños insectos y crustáceos en las riberas del mar o de ríos. Es muy bullicioso. Se reproduce entre noviembre a diciembre y el nido es una depresión en el sustrato arenoso. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la zona costera de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto volando en la zona de Punta Itata (38).

South American Tern



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Rayador

Rynchops niger



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 46 cm. El rayador se distribuye en Chile entre Arica y el Estrecho de Magallanes. Su hábitat lo componen generalmente bahías costeras, estuarios y desembocaduras de ríos. Muy gregario. Al descansar lo hace posado en el suelo, de cara al viento. Activo en la mañana y al atardecer, permanece en reposo en las horas de mayor calor. Se alimenta de peces pequeños y también de insectos, crustáceos o moluscos. No anida en Chile. Su nido es una depresión en terrenos arenosos. Pone de 3 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual, la mandíbula inferior en el macho es más larga que la de la hembra. A la izquierda, un adulto volando en la playa de Punta Itata (38). A la derecha, un grupo de adultos volando en la zona de la desembocadura del Río Loa (33).

Black Skimmer



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Paloma de alas blancas

Zenaida meloda



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 30 - 36 cm. La paloma de alas blancas se distribuye entre Arica y Coquimbo, desde el nivel del mar hasta los 2.700 m. de altitud, habitando valles, oasis, plantaciones, zonas arboladas, plazas y parques. Se ve habitualmente en pareja y no forma grandes bandadas. Se alimenta principalmente de semillas en el suelo. Nidifica sobre ramas y pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos en la ciudad de Antofagasta (47).

West Peruvian Dove



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Paloma de ala moteada

Patagioenas maculosa albipennis



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 32 cm. Existen 2 subespecies de paloma de ala moteada reconocidas para Chile. La subespecie en la Región de Antofagasta se distribuye en la zona altoandina entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, sobre los 3.500 m. de altitud. Habita principalmente zonas semiabiertas secas con vegetación arbórea dispersa y tierra agrícolas. Gregaria en grupos pequeños. No rehúye los asentamientos humanos, aunque es temerosa de las personas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en la localidad de Caspana (8). A la derecha, un adulto observado en la localidad de Amincha (3).

Spot-winged Pigeon



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Paloma doméstica

Columba livia



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 30 - 36 cm. La paloma doméstica se distribuye en todo el territorio continental, Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández, desde el nivel del mar hasta los 3.000 m. de altitud. Abundante en parques, plazas y zonas de cultivos. Gregaria, forma grandes bandadas en áreas urbanas. En algunas ciudades y en aeropuertos es considerada una plaga. Es omnívora llegando a comer desechos de alimentos humanos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Las fotografías corresponden a adultos en una plaza en Antofagasta (47).

Rock Pigeon



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tórtola común

Zenaida auriculata



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 23 - 28 cm. La tórtola común se distribuye en Chile entre Arica y Tierra del Fuego, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Común en zonas urbanas, parques, jardines, bordes de bosques, zonas agrícolas, oasis y matorrales. Gregaria, en pareja, a veces forma bandadas. Muy tolerante a las personas cuando no la amenazan. Tiene el vuelo rápido y batido a baja altura con frecuentes cambios de dirección. Nidifica generalmente en árboles o arbustos y su nido lo construye en base a palitos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos en un parque en Antofagasta (47).

Eared Dove



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Tórtola cordillerana

Metriopelia melanoptera



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 21 - 23 cm. La tortolita cordillerana se distribuye desde Arica hasta Tierra del Fuego, ocupando una gran variedad de hábitats, principalmente entre los 1.000 y 4.000 m.s.n.m. Gregaria, en parejas o pequeños grupos. Poco visible cuando está posada en el suelo. Se alimenta en el suelo principalmente de semillas. En invierno, forma grandes bandadas y migra al norte donde también se reproduce. Generalmente nidifica en colonias de 10 a 20 parejas, en arbustos tupidos cercanos a cuerpos de agua. Construye su nido de palitos muy ligeros.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual. Las fotografías corresponden a un adulto observado en la zona de Neurara al sur del Salar de Atacama (29).

Black-winged Ground Dove



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tortolita de la puna

Metriopelia aymara



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Golden-spotted Ground Dove

DESCRIPCIÓN: L. 18 cm. La tortolita de la puna se distribuye desde Arica hasta Coquimbo, comúnmente entre los 3.000 y 4.500 m.s.n.m. Se puede encontrar principalmente en sectores áridos y pedregosos, y en las cercanías de cuerpos de agua. Se agrupa en bandadas bulliciosas y cuando se desplaza a sus zonas de alimentación lo hace a gran altura. Se alimenta en el suelo. Nidifica en túneles excavados en laderas o en cortes de río y tiene mucha fidelidad a las colonias de reproducción.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la zona de Peine (25). A la derecha, un adulto en Amincha (3).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tortolita quiguagua

Columbina cruziana



Fotografía: Ariel Silva Narváez

DESCRIPCIÓN: L. 15 - 17 cm. La tortolita quiguagua se distribuye entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Atacama. Desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. de altitud. Habita oasis, valles cultivados, plazas y jardines. Generalmente se encuentra en parejas o en pequeñas bandadas y asociada principalmente a otras aves (ej. palomas). Se alimenta de semillas las que recoge desde el suelo. Anida en árboles o arbustos. Construye su nido a poca altura con palitos secos. Pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, la hembra tiene la cabeza un poco más clara que el macho. Ambas imágenes corresponden a un macho adulto registrado en una plazoleta en Antofagasta (47).

Croaking Ground Dove



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Pequén

Athene cunicularia



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Burrowing Owl

DESCRIPCIÓN: L. 18 - 26 cm. El pequén se encuentra ampliamente distribuido en Chile, desde Pica hasta Valdivia y del nivel del mar a los 3.000 m. de altitud. Habita zonas abiertas, pastizales, valles desérticos, zonas agrícolas y claros herbáceos dentro de los matorrales. Generalmente se observa en pareja o en grupos familiares y es común verlo posado en el suelo. De comportamiento más diurno y crepuscular que nocturno. Se alimenta principalmente de roedores pequeños y coleópteros. Anida en el suelo o en cuevas a poca altura. Pone de 4 a 7 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la costa norte de Antofagasta (47). A la derecha, una pareja en su nido en la zona de Yalquincha en Calama (11).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tucúquere

Bubo virginianus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 45 - 50 cm. Búho ampliamente distribuido en Chile, de Arica a Tierra del Fuego y desde el nivel del mar hasta los 4.500 m. de altitud. Habita zonas boscosas y quebradas cordilleranas. Generalmente se observa en pareja. De hábitos nocturnos, de día es posible verlo posado en árboles o roqueríos. Se alimenta principalmente de roedores y otros mamíferos menores, incluso conejos y liebres. Generalmente nidifica aprovechando un nido de alguna otra ave de rapiña (ej. águila o peuco). También nidifica en cuevas o grietas profundas en las rocas. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual, aunque la hembra puede ser un poco más grande y robusta que el macho. Ambas imágenes corresponden a un adulto observado en el Valle de Jere (18).

Great Horned Owl



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Gallina ciega común

Systellura longirostris bifasciatus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 25 cm. La distribución de la gallina ciega común abarca desde Antofagasta hasta la Patagonia, entre el nivel del mar y los 3.000 m. de altitud. Se encuentra en una gran variedad de hábitats: oasis, zonas arbustivas, matorrales y zonas agrícolas. De plumaje muy críptico, vuelo desordenado y de hábitos crepusculares o nocturnos. De día descansa en el suelo, en lugares protegidos del sol y de noche vuela cazando insectos. En áreas rurales acostumbra a alimentarse de insectos voladores en torno a los alumbrados públicos. Construye su nido en el suelo en zonas escasamente vegetadas y sin ninguna protección especial. Pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembras diferentes. Ambas fotografías corresponden a un macho en la Reserva Nacional La Chimba (46).

Band-winged Nightjar



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Picaflor del norte

Rhodopsis vesper



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Oasis Hummingbird

DESCRIPCIÓN: L. 13 cm. En Chile, la distribución del picaflor del norte se restringe a la zona entre Arica y Antofagasta. Muy extendido en el norte, se encuentra alrededor de poblaciones, zonas agrícolas, quebradas con vegetación, parques y plazas. Acostumbra a descansar por largos períodos de tiempo en el mismo lugar. Es muy agresivo y defiende su territorio de otros picaflores. Se alimenta del néctar de las flores y de pequeños insectos. Nidifica en cualquier parte que cuente con agua y algo de vegetación. Su nido en forma de taza, lo arma de ramitas y lana generalmente en alguna rama de árbol o arbusto. Pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembra diferentes. A la izquierda, una hembra. A la derecha, un individuo macho. Ambas fotografías corresponden a adultos observados en Antofagasta (47).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Carancho cordillerano

Phalcoboenus megalopterus



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 52 - 56 cm. La distribución del carancho cordillerano en Chile abarca desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de O'Higgins y vinculado principalmente a la Cordillera de los Andes, aunque también es posible observarlo en áreas menos altas (ej. en las cercanías de Calama). Ocupa pastizales, humedales y acantilados y generalmente se ve solitario o en pareja. Busca su alimento caminando y escarbando en la tierra y su dieta la componen lagartijas, roedores y algunas veces desperdicios y carroña. Se reproduce entre octubre y diciembre. Nidifica en pequeñas depresiones en una roca o peñasco de altura. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un juvenil volando en el área de Calama (11). A la derecha, un individuo adulto en El Tatio (7).

Mountain Caracara



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Cernícalo

Falco sparverius peruvianus



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 30 - 38 cm. En Chile existen 3 subespecies de cernícalo, la especie más nortina se distribuye de la Región de Arica y Parinacota a la Región de Atacama, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. de altitud. Su hábitat lo conforman principalmente pastizales, campos abiertos y, en ocasiones, también se encuentra en la costa y en ciudades. Solitario, se posa en sitios elevados como ramas, postes junto a los caminos, cables, antenas y desde allí acecha a sus presas, que generalmente son pequeños roedores. También acecha a sus presas desde el aire, realizando una especie de vuelo suspendido; cuando detecta a su presa se lanza sobre ella a gran velocidad. Nidifica en árboles, riscos o construcciones. Pone normalmente de 3 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, un macho adulto posado en un poste de alumbrado público en Antofagasta (47). A la derecha, una hembra observada al lado de la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama (11).

American Kestrel



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Halcón perdiguero

Falco femoralis pichincae



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 36 - 45 cm. En Chile están presentes 2 subespecies de halcón perdiguero. La subespecie en la Región de Antofagasta se distribuye entre Arica y Concepción, desde el nivel de mar hasta los 3.800 m. de altitud. Sus hábitats son muy variados, todos son abiertos o semiabiertos; desiertos, cultivos y matorrales. Generalmente se ve solitario y habitualmente se posa en los postes, rocas o arbustos, desde donde acecha a sus presas. Caza aves en vuelo, ocasionalmente también come reptiles y mamíferos pequeños. Construye su nido en altura, de palos secos y lo forra de pastos y raíces blandas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la ciudad de Antofagasta (47). A la derecha, un adulto registrado al sur de Tilopozo (27).

Aplomado Falcon



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Halcón peregrino

Falco peregrinus cassini



Fotografía: Carlos Zavalaga Reyes

DESCRIPCIÓN: L. 38 - 50 cm. En Chile existen 3 subespecies de halcón peregrino. La subespecie en la Región de Antofagasta se distribuye entre Arica y Tierra del Fuego, desde la costa hasta los 4.500 m.s.n.m. Ocupa una gran variedad de ambientes, de preferencia acantilados tanto en la Cordillera de los Andes como en la costa. También se puede observar en las ciudades. Solitario o en pareja. Recorre grandes distancias en sus desplazamientos migratorios. Su vuelo es tranquilo y pausado vigilando permanentemente el terreno en busca de sus presas. Se alimenta principalmente de aves (ej. palomas), las que normalmente las caza en vuelo. Construye su nido en riscos o acantilados de difícil acceso y desde donde domina todo su entorno. También es posible encontrarlo anidando en edificios altos en la ciudades. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Vulnerable*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado al este del poblado de Quillagua (34). A la derecha, un adulto en la zona de Playa Grande al norte de Mejillones (39).

Peregrine Falcon



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Traro (Carancho común)

Caracara plancus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 49 - 65 cm. En Chile, el traro se distribuye desde Arica hasta Tierra del Fuego, ocupando variados hábitats tales como: cultivos, bosques abiertos y estepas. En el norte de Chile está muy asociado al litoral e islotes cercanos a la costa. Solitario o en pareja, en ciertas ocasiones se puede agrupar e incluso cazar asociadamente. Busca su alimento desde el aire o en tierra caminando ágilmente. Es oportunista, puede capturar presas vivas (ej. mamíferos pequeños, aves, reptiles) o comer carroña. Se reproduce entre noviembre y diciembre. Construye su nido en árboles altos y a la falta de éstos, lo hace en matorrales, salientes de farellones o en estructuras metálicas (ej. grandes letreros camineros o bajo puentes). El nido es de forma de taza, construido de palos secos y forrado de pasto o lana. Pone normalmente 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo juvenil caminando en la pampa costera de Mejillones en el sector de Playa Grande (39). A la derecha, un individuo adulto volando en la costa de Antofagasta (47).

Southern Caracara



Fotografía: Jorge Fuentes Figueroa

Perico cordillerano

Psilopsiagon aurifrons



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 17 - 19 cm. El perico cordillerano se distribuye desde Arica hasta Antofagasta, normalmente entre los 3.000 y 4.500 m.s.n.m. Ocupa hábitats de alturas andinas a menudo cerca de los acantilados y de cuerpos de agua. Gregario. Anida en colonias en agujeros en las rocas o acantilados.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos en la zona de Kosca (1).

Mountain Parakeet



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tapaculo

Scelorchilus albicollis atacamae



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

White-throated Tapaculo

DESCRIPCIÓN: L. 18 - 20 cm. El tapaculo es una especie endémica de Chile que presenta 2 subespecies. La subespecie *atacamae* se distribuye desde la Quebrada Paposo hasta el Valle del Elqui, desde el nivel del mar hasta los 1.700 m. de altitud. Habita laderas secas con arbustos densos, preferentemente a lo largo de pequeños barrancos. Solitario o en pareja, prácticamente no vuela. Busca su alimento escarbando en el suelo con sus patas. Básicamente es un ave insectívora, aunque también come arácnidos y pequeños reptiles. Construye su nido con pasto seco en pequeñas cuevas donde pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos observados en la Quebrada Paposo (49).



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Minero Chico

Geositta maritima



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Grayish Miner

DESCRIPCIÓN: L. 14 cm. El minero chico se distribuye entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama, desde el nivel del mar hasta los 3.500 m. de altitud. Es propio de ambientes extremadamente áridos. Solitario o en pareja. Parece ser menos tolerante a las personas que otras especies de mineros. En invierno puede reunirse en bandadas y es posible encontrar algunos individuos en pleno desierto. Se alimenta de semillas e insectos recogidos del suelo. Su nido lo ubica en túneles excavados por el mismo, en laderas de arenas blandas o sueltas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo adulto en la Reserva Nacional La Chimba (46). A la derecha, un adulto en la Quebrada Paposo (49).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Minero común

Geositta cunicularia titicacae



Fotografía: Aracelli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 15 - 16 cm. En Chile existen 5 subespecies de minero común. La subespecie *titicacae* se distribuye entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, desde el nivel del mar hasta los 4.600 m. de altitud. Es propio de ambientes áridos, sectores pedregosos, dunas costeras y litoral desértico. Solitario o en pareja. Es muy terrestre y le gusta posarse en el suelo. Muchas veces se aleja del peligro caminando, aunque cuando es necesario vuela. Se alimenta de artrópodos y semillas recogidas desde el suelo. Durante la época reproductiva vuela en círculos cerca del suelo con una ondulación muy marcada. El nido es ubicado en túneles excavados por el mismo, en zonas de laderas de arenas blandas o sueltas. Su nidada generalmente es de 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos en la zona al sur de Peine (25).

Common Miner



Fotografía: Aracelli Marín Aguilar

Minero cordillerano

Geositta rufipennis harrisoni



Fotografía: Charly Moreno Taucare

DESCRIPCIÓN: L 16 - 17 cm. Existen 3 subespecies reconocidas de minero cordillerano. La subespecie *harrisoni* es endémica de las quebradas del sector de Paposo. Solitario, en pareja o pequeños grupos. Es poco conspicuo y confiado, acostumbra realizar vuelos cortos, manteniéndose cerca del suelo. Su dieta la componen insectos, semillas y brotes de hojas que recoge desde el suelo. Su reproducción es entre noviembre y marzo. Su nido lo ubica en un corte del terreno, ladera o grieta en una roca. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda un juvenil y a la derecha un adulto. Ambas fotografías corresponden a individuos observados en la Quebrada Paposo (49).

Rufous-banded Miner



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Minero de la puna

Geositta punensis



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 14 cm. El minero de la puna es propio de los ambientes de la alta cordillera desde Parinacota hasta el norte de Atacama, entre los 3.500 y 5.000 m.s.n.m. Habita terrenos secos y arenosos de vegetación escasa y baja. Se ve solitario o en pareja, mostrándose confiado y poco conspicuo. Sus vuelos son cortos, acelerados, a baja altura y camina moviendo el cuerpo de manera muy marcada. Se alimenta de artrópodos y semillas que toma desde el suelo. Nidifica en cuevas aprovechando las madrigueras en desuso del tuco tuco (roedor fosorial de tamaño mediano). Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Las fotografías corresponden a adultos observados en la zona de Tilomonte (26).

Puna Miner



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Minero grande

Geositta isabellina



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 17 - 19 cm. El minero grande se distribuye en la alta cordillera desde la Región de Antofagasta hasta la Región del Maule, entre los 2.500 y 4.000 m.s.n.m. Habita quebradas y riscos, laderas pedregosas cerca del agua y es recurrente en los bofedales. Durante el Invierno baja a los 2.000 m.s.n.m. Solitario, en pareja o en pequeños grupos, es poco conspicuo y confiado. Acostumbra hacer vuelos cortos manteniéndose cerca del suelo. Construye su nido al final de un túnel en laderas inclinadas. Pone 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto observado en el Salar de Imilac (30).

Creamy-rumped Miner



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Bandurrilla común

Upucerthia dumetaria hypoleuca



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Scale-throated Earthcreeper

DESCRIPCIÓN: L. 21 cm. En Chile habitan 3 subespecies de bandurrilla. La subespecie *hypoleuca*, se distribuye desde la Pampa del Tamarugal hasta Talca, entre el nivel del mar y los 4.000 m. de altitud. Habita ambientes abiertos, sectores con vegetación arbustiva y áreas semiáridas con vegetación baja. Solitaria o en pareja. Muy territorial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto observado en las cercanías de Socaire (23). A la derecha, un adulto en la Quebrada Paposo (49).



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Bandurrilla de pico recto

Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus

Straight-billed Earthcreeper

DESCRIPCIÓN: L. 16 - 19 cm. En Chile existen 2 subespecies de bandurrilla de pico recto. La subespecie en la Región de Antofagasta se distribuye desde Tarapacá hasta Coquimbo, entre los 2.500 y 3.000 m.s.n.m., habitando preferentemente laderas rocosas con arbustos dispersos. Solitaria o en pareja. Es tímida, nerviosa y siempre está atenta al entorno. Camina con la cola levantada y corre rápido por el suelo mientras busca su alimento, que se compone principalmente de artrópodos. Ubica su nido al final de un túnel excavado en un corte de terreno o en grietas entre las rocas. Pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos observados camino a la Laguna Miscanti en las cercanías de Socaire (23).



Fotografía: Araceli Marín Aguilar



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Canastero cordillerano (Canastero chico) Cordilleran Canastero

Asthenes modesta



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 14 - 16 cm. El canastero cordillerano se distribuye desde Arica hasta Antofagasta, usualmente entre los 3.000 y 4.500 m.s.n.m. Habita preferentemente la zona de la puna y se asocia a laderas rocosas con arbustos dispersos y también a los bordes húmedos de bofedales con rocas grandes. Es terrestre, solitario, confiado y pocas veces trepa a los arbustos. Se desplaza por los roqueríos y camina con la cola recta. Se posa en las rocas o peñascos. Al verse amenazado corre y se oculta tras las piedras o la vegetación. Se alimenta de insectos. Nidifica ocultando el nido entre las rocas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la Laguna Aguas Calientes (4). A la derecha, un adulto de canastero cordillerano en la Quebrada del Inca, cerca de Amincha (2).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Churrete acanelado del norte (Churrete de ala crema) Cream-winged Cinclodes

Cinclodes albiventris



Fotografía: Aracelli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 18 cm. En Chile, el churrete acanelado del norte se distribuye en el altiplano de Arica, Iquique y Antofagasta, entre los 2.500 y 5.000 m.s.n.m. Asociado a pastizales y áreas cercanas a cuerpos de agua, bofedales, lagos y riachuelos. Solitario o en pareja. No es temeroso de las personas. Comúnmente lleva la cola levantada y es buen caminador. Se alimenta de insectos. Nidifica en agujeros o en cortes de terreno. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un churrete acanelado fotografiado en Amincha en las cercanías de Ollagüe (3). A la derecha, un adulto en San Pedro de Atacama (15).



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Churrete costero

Cinclodes nigrofumosus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 27 cm. El churrete costero es una especie endémica de Chile y se distribuye desde Arica hasta Valdivia. Es estrictamente marino costero y nunca se encuentra lejos de la costa. Habita sectores rocosos, rompientes e islotes cercanos a la costa. Habitualmente se ve solo o en pareja. Recorre su territorio entre las rocas, algas o arena buscando su alimento, que se constituye de invertebrados marinos. Tolerante frente a la presencia humana, aunque es muy movedizo. Anida en grietas entre las rocas o riscos. Pone 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto de churrete costero en la costa cerca de Bolsico (43). A la derecha, un adulto en la zona de Coloso, al sur de Antofagasta (48).

Seaside Cinclodes



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Churrete de ala blanca

Cinclodes atacamensis



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 23 cm. Ave propia de la alta cordillera desde Arica hasta Coquimbo, entre los 2.500 y 4.600 m.s.n.m., siempre asociada a cuerpos de agua. Solitario o en pareja. No es muy tolerante a las personas y agresivo frente a sus congéneres. Se alimenta de insectos, arácnidos y caracoles. Su nido lo construye en túneles ubicados en laderas, grietas en rocas o agujeros en paredes. Pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo adulto en el Valle de Jere (18). A la derecha, un adulto en la zona de Amincha (3).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Tijeral común

Leptasthenura aegithaloides



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Plain-mantled Tit-Spinetail

DESCRIPCIÓN: L. 15 - 18 cm. El tijeral común está presente en una gran variedad de ambientes entre Arica y Atacama, desde la costa hasta los 4.300 m.s.n.m. Principalmente habita zonas áridas con matorrales, también parques y áreas urbanas. Solitario o en pareja. Es muy inquieto, acostumbra a moverse entre las ramas de los árboles o arbustos. Para alimentarse se cuelga de las ramas buscando insectos. Su vuelo es a baja altura, breve y ondulante. Nidifica en agujeros de árboles, cactus o rocas. Pone de 2 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en el Valle de Puques (16). A la derecha, un tijeral adulto en la Quebrada Paposo (49).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Trabajador

Phleocryptes melanops loaensis




Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 13 cm. En Chile están presentes 2 subespecies de trabajador. En la Región de Antofagasta la subespecie *loaensis* se encuentra exclusivamente en las áreas de los ríos Loa y San Salvador. Solitario y es frecuente en zonas con juncos y totora, pero solo periféricamente. Se desplaza ágilmente entre los totorales. Es curioso, muy movedizo y es mucho más fácil de oír que ver. Se alimenta de insectos. Construye un nido muy elaborado entrelazando fibras vegetales reforzadas con barro. El nido es de forma redondeada o alargada y tiene una sola entrada.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, una adulto en el Río Loa en Calama (11). A la derecha, un adulto en el Río Loa en Quillagua (34).

Wren-like Rushbird



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Cachudito común

Anairetes parulus



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 11 - 12 cm. El cachudito común se distribuye desde la Quebrada Paposo hasta Cochrane (Magallanes), entre el nivel del mar y los 2.600 m. de altitud. Habita valles y laderas muchas veces asociado a arbustos y árboles, especialmente al pimientto. Se puede observar solitario o en pareja y es muy tímido. Se alimenta de pequeños insectos, frutos y también de semillas. Se reproduce desde agosto a enero y su nido es tipo taza hecho de líquenes, raíces y pasto forrado con plumas. Pone generalmente 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto y a la derecha, un juvenil. Ambas fotografías corresponden a individuos observados en la Quebrada Paposo (49).

Tufted Tit-Tyrant



Fotografía: Nelson Amado Pool

Cazamoscas boreal (Benteveo blanco y negro)

Tyrannus tyrannus



Fotografía: Charly Moreno Taucare

DESCRIPCIÓN: L. 22 cm. En Chile, el cazamoscas boreal es un visitante ocasional durante la época estival. Suele migrar desde Norteamérica principalmente a Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia. En Chile ha sido registrado en las zonas de Arica, Calama, Tocopilla, Antofagasta y Santo Domingo; habitando zonas semiboscadas, pastizales, terrenos abiertos y cultivados. Es solitario y silencioso, aunque durante la migración forma grandes bandadas. Se alimenta principalmente de insectos, también de frutos y semillas. Durante la nidificación presenta conductas agresivas de ataque cuando intrusos intentan acercarse a sus nidos (ej: halcones o cuervos).

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos observados en la localidad de Baquedano (41).

Eastern Kingbird



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Cazamoscas tijereta

Tyrannus savana



Fotografía: Charly Moreno Taucare

DESCRIPCIÓN: L. 28 - 38 cm. Ave errante que se distribuye habitualmente entre Brasil, Bolivia y norte de Argentina. En Chile se han registrado algunos individuos desde Iquique hasta Talcahuano, siendo la mayoría de éstos registros en la zona norte. Habita áreas abiertas, sectores con vegetación arbórea dispersa y también se puede ver en ciudades. Solitario, en pareja o en grupos familiares, durante el invierno puede formar grandes bandadas. Es muy conspicuo y se posa en sitios visibles desde donde acecha el paso de los insectos. También se alimenta de bayas y frutos. Construye su nido con forma de copa, en un árbol o arbusto. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un juvenil observado la localidad de Baquedano (41).

Fork-tailed Flycatcher



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Colegial del norte

Lessonia oreas



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 12 cm. El colegial del norte está presente en la alta cordillera, desde Arica hasta Coquimbo entre los 3.500 y 4.000 m.s.n.m. Muy asociado al agua, se encuentra en bofedales, bordes de lagos y otros humedales de altura. Normalmente se ve solitario o en pareja. Es terrestre en todas sus rutinas, aunque también vuela a baja altura. Muy movedizo y es habitual verlo corriendo y deteniéndose a buscar su alimento (ej. invertebrados). Confiado ante la presencia humana. Su nido tipo taza lo construye en el suelo, oculto entre la vegetación. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, hembra de colegial del norte en el sector de Aguas Calientes, cerca de Ollagüe (4). A la derecha, un macho en el vado del Río Putana (12).

Andean Negrito



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Diucón (Urco)

Xolmis pyrope



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 21 cm. El diucón se distribuye desde el sur de Antofagasta hasta el Cabo de Hornos, entre el nivel del mar y los 2.000 m. de altitud. Habita bordes de bosques y zonas agrícolas abiertas, jardines y plazas en las ciudades. Solitario, aunque a veces en invierno, es posible ver concentrados a varios ejemplares en áreas pequeñas. Se posa en ramas o áreas expuestas a esperar el paso de los insectos, los que captura en el aire o suelo. Construye su nido con forma de taza, en árboles o arbustos, usando pequeños palos y pasto seco. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Las fotografías corresponden a adultos observados en la Quebrada Paposo (49).

Fire-eyed Diucon



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Dormilona chica

Muscisaxicola maculirostris



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 15 cm. La dormilona chica se distribuye entre Arica y Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. de altitud. Prefiere laderas o riberas rocosas y quebradas con matorrales. En invierno se desplaza a sectores más bajos, llegando algunos individuos al nivel del mar. Usualmente solitaria, aunque en el invierno es posible verla formando pequeñas bandadas. Tiende a posarse erguida. Camina rápido. En el período nupcial realiza un vuelo alto y se deja caer planeando, emitiendo un canto muy particular. Nidifica en la cordillera de la zona norte sobre los 2.000 m. de altitud. Elige las laderas semiarbustivas colocando el nido en el suelo, oculto entre alguna planta o piedra. Su nidada consta de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en Kosca (1). A la derecha, un adulto en la Quebrada Paposo (49).

Spot-billed Ground-Tyrant



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Dormilona de nuca rojiza

Muscisaxicola rufivertex pallidiceps



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 17 cm. La subespecie de dormilona de nuca rojiza (*pallidiceps*), se distribuye desde Parinacota hasta Antofagasta. Es propia de ambientes de la prepuña seca con algunos troncos o arbustos altos. También habita laderas rocosas y tierras de cultivo. En invierno migra hacia zonas bajas llegando hasta la costa. Generalmente solitaria y se posa muy erguida. Busca su alimento (ej. insectos) visualmente y corre a capturarlos, luego abre y cierra la cola varias veces. También se alimenta de frutos y durante el invierno, en la zona costera, se alimenta de crustáceos marinos. Nidifica en grietas de muros de piedras, entre rocas o en pircas. Pone de 2 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la Quebrada Paposo (49). A la derecha, un adulto en las cercanías de Socaire (23).

Rufous-naped Ground-Tyrant



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Dormilona fraile

Muscisaxicola flavinucha



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Ochre-naped Ground-Tyrant

DESCRIPCIÓN: L. 20 cm. En Chile, la dormilona fraile se distribuye desde Arica hasta Puerto Montt, entre los 2.000 y 4.000 m.s.n.m. Habita en la puna, prefiriendo lugares moderadamente húmedos con herbazales bajos. Solitaria, aunque durante los movimientos migratorios se reúne en bandadas de gran tamaño. Tiene el hábito de pararse erguida y mantener las alas abiertas por un momento. Se alimenta de insectos. Es excesivamente cautelosa y esconde su nido entre grietas u hoyos. Pone de 2 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la zona de Kosca (1). A la derecha, un adulto en el Salar de Imilac (30).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Dormilona tontita (Dormilona de cara negra) Dark-faced Ground-Tyrant

Muscisaxicola maclovianus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 16 cm. La dormilona tontita generalmente está presente en el sur de Chile y migra hacia el norte durante el invierno. Se encuentra en ambientes abiertos y diversos, tales como: valles, praderas, playas y zonas montañosas. Acostumbra a caminar muy rápido, al detenerse abre y cierra la cola 2 ó 3 veces. Es muy curiosa ante la presencia humana. Construye un nido del tipo taza, con hierbas y raicillas y lo ubica en grietas o huecos entre las rocas. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en Bolsico (43). A la derecha, un adulto en Antofagasta (47).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Mero de Tarapacá (Mero de vientre gris) Gray-bellied Shrike-Tyrant

Agriornis micropterus andecola



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 14 cm. En Chile existen 2 subespecies del mero de Tarapacá. La subespecie *andecola* se distribuye en la zona cordillerana entre Arica y Antofagasta, entre los 2.000 y 4.000 m.s.n.m. Habita preferentemente la puna arbustiva árida y lechos de ríos. Solitario, no forma grupos. Es temeroso y desconfiado. Muy Territorial y local. Se alimenta de insectos grandes y reptiles pequeños. Su nido es voluminoso y tiene forma de taza. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a un adulto en las cercanías de Socaire (23).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Mero gaucho

Agriornis montanus maritima



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Black-billed Shrike-Tyrant

DESCRIPCIÓN: L. 23 cm. En Chile están presentes 3 subespecies del mero gaucho, que se distribuyen desde el nivel del mar hasta los 4.600 m. de altitud. La subespecie *maritima* está muy extendida en la Cordillera de los Andes y también está presente en las zonas bajas de la Región de Antofagasta. Se puede observar en laderas rocosas cerca de pastizales y ocasionalmente se acerca a los asentamientos humanos. Es solitario, no forma grupos. Busca sitios altos de buena visibilidad donde pararse. Canta temprano en las mañanas. Es muy curioso y frecuentemente se acerca a las personas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en la Quebrada Paposo (49). A la derecha, un adulto cerca de Machuca (13).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Sietecolores

Tachuris rubrigastra loaensis



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Many-coloured Rush-Tyrant

DESCRIPCIÓN: L. 10 - 11 cm. En Chile existen 2 subespecies de sietecolores, la subespecie *loaensis* es endémica del Río Loa y está asociada principalmente a juncos cerca del agua. Solitario, en pareja o grupos familiares. Muy rápido en sus desplazamientos entre los juncos. Se alimenta de pequeños insectos y otros invertebrados. Muy agresivo con sus congéneres en periodos reproductivos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos observados en el Río Loa, en la zona del Puente Posada (36).



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Golondrina bermeja

Hirundo rustica



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 16 - 17 cm. La golondrina bermeja es visitante de verano que se distribuye entre Arica y Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. de altitud. Habita zonas abiertas, agrícolas, valles con oasis y pasturas normalmente cerca del agua. En la zona norte es común verla durante las épocas de primavera y verano, volando en pequeñas bandadas alrededor de zonas con vegetación. Es característico que se pose en los cables del tendido eléctrico. Se alimenta principalmente de insectos. Nidifica en Norteamérica entre el círculo polar ártico y el norte de México. No existen registros de nidificación en Chile.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, el macho tiene la cola levemente más larga que la hembra. La fotografía de la izquierda corresponde a un adulto en Chiu Chiu (10). A la derecha, un adulto volando en Antofagasta (47).

Barn Swallow



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Golondrina de dorso negro

Pygochelidon cyanoleuca



Fotografía: Patricia Bolados Díaz

DESCRIPCIÓN: L. 12 cm. La golondrina de dorso negro se distribuye en todo el territorio nacional, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. de altitud. Habita áreas abiertas, sectores húmedos, áridos, temperados o tropicales y regularmente se acerca a zonas con presencia humana. Comúnmente se puede ver en pequeñas bandadas o parejas reproductoras aisladas. Frecuentemente se posa en el suelo o en piedras bajas para descansar. Nidifica en grietas entre las rocas o en túneles excavados en barrancos o cortes de terreno. El nido está hecho de fibras de raíces o pastos secos. Pone de 3 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a adultos observados en las inmediaciones del Río Loa en Calama (11).

Blue-and-white Swallow



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Golondrina de pecho pardo (Golondrina parda) Brown-chested Martin

Progne tapera



Fotografía: Ariel Silva Narváez

DESCRIPCIÓN: L. 18 cm. La golondrina de pecho pardo es visitante ocasional en la zona norte de Chile. Se distribuye ampliamente desde el centro de Argentina hasta Panamá y Costa Rica. En Chile, anteriormente se había registrado solo en Arica y Mejillones. Habita zonas abiertas o semiabiertas con árboles, cerca de cursos de agua; también en espacios humanos incluidas las ciudades. Se alimenta de insectos voladores y terrestres. Su nido es construido con hierbas secas y forrado con plumas. Pone entre 3 y 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imagenes corresponden a un adulto observado en el poblado de Baquedano (41).



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Chercán común

Troglodytes aedon atacamensis




Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 11 cm. En Chile están presentes 3 subespecies de chercán común. La subespecie *atacamensis* se distribuye desde la Quebrada de Tana (entre Arica e Iquique) hasta El Tofo (entre Huasco y La Serena). Se encuentra en una gran variedad de ambientes, tales como: matorrales o arbustos, bordes de bosques, parques urbanos, matorrales costeros. Solitario o en pareja. Ágil y rápido, se mueve entre la vegetación dando pequeños saltos de rama en rama. Vuela a baja altura distancias cortas y pocas veces baja al suelo. Confiado ante la presencia humana. Construye su nido en una gran variedad de sustratos naturales o artificiales. Durante la reproducción, el macho canta complejas melodías desde un punto alto al mismo tiempo que bate las alas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un chercán en la desembocadura del Río Loa (33). A la derecha, un adulto en la ciudad de Antofagasta (47).

House Wren



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Zorzal negro

Turdus chiguanco anthracinus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 26 cm. En Chile existen 2 subespecies de zorzal negro. La subespecie *anthracinus* se distribuye en la cordillera de la Región de Antofagasta hasta los 3.600 m.s.n.m. Es muy común en los alrededores del Salar de Atacama, específicamente en los bordes de los campos de cultivo, pueblos y quebradas arbustivas secas. Solitario o en pareja. El macho suele cantar desde un punto alto. Es confiado ante la presencia humana.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, la hembra es un poco más clara y de pico amarillo suave. El adulto de la izquierda fue fotografiado en el Valle de Jere (18) y el de la derecha, cerca de San Pedro de Atacama (15).

Chiguanco Thrush



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Tenca de alas blancas

Mimus triurus



Fotografía: Aracelli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 22 cm. La tenca de alas blancas es una especie errante que se distribuye desde el nivel del mar hasta los 3.000 m. de altitud. En la Región de Antofagasta se ha observado en Toconao y en la ciudad de Antofagasta. Habita lugares arbustivos abiertos y asentamientos humanos. Solitaria o en pareja, acostumbra posarse en un arbusto y desde allí emite un canto melodioso. Su nido es de estructura abierta de ramas con fibras vegetales y flores, protegido por la vegetación. Pone de 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. A la izquierda, un adulto en el Valle de Jere (18). A la derecha, un adulto en un parque de Antofagasta (47).

White-banded Mockingbird



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Bailarín chico común

Anthus correndera catamarcae



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 14 - 16 cm. En Chile existen 2 subespecies de bailarín chico común. La subespecie *catamarcae* se distribuye en la cordillera de la Región de Antofagasta, entre los 2.500 y 4.000 m.s.n.m. Habita pastizales nativos y agrícolas, campos cultivados, pasturas y bordes de pantanos. Se ve solo o en pareja, normalmente en el suelo o posado en las rocas. Es muy caminador y prefiere esconderse entre la vegetación antes que volar. Nidifica en el suelo entre el pasto. Pone de 3 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas fotografías corresponden a adultos en la Laguna Aguas Calientes (4).

Correndera Pipit



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Chirihue cordillerano

Sicalis uropygialis



Fotografía: Nelson Amado Pool

Bright-rumped Yellow - Finch

DESCRIPCIÓN: L. 13 - 14 cm. El chirihue cordillerano se distribuye desde Arica hasta Antofagasta, principalmente en el altiplano entre los 3.500 y 4.500 m.s.n.m. Habita lugares húmedos, a menudo cerca de casas y corrales. Se alimenta preferentemente de semillas y en época reproductiva también consume artrópodos. Su nido tiene forma de taza, construido con hierbas secas y ubicado generalmente en edificaciones de adobe. Pone 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembra diferentes. La hembra es más pardusca por encima. Ambas imágenes corresponden a un macho adulto observado en las Vegas de Quepiaco (19).



Fotografía: Nelson Amado Pool

Chirihue dorado

Sicalis auriventris



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 14 - 16 cm. El chirihue dorado se distribuye desde Antofagasta hasta Temuco entre los 2.000 y 4.000 m.s.n.m. Habita laderas rocosas, estepas y matorrales de la zona cordillerana, también es atraído por los humedales andinos. Se puede ver en pareja o grupos, aunque en invierno, forma bandadas de cientos de individuos que se desplazan a tierras bajas. Es confiado y se acerca a las poblaciones humanas. Se alimenta de semillas. El macho como parte de su despliegue nupcial acostumbra a cantar con las alas abiertas y vibrando. La reproducción es entre diciembre y febrero. Ubica su nido en un agujero o entre las rocas de acantilados o laderas. Pone 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembra diferentes. A la izquierda, un macho en la Quebrada Paposo (49). A la derecha, una pareja (la hembra es menos colorida), en la zona de Neurara al sur del Salar de Atacama (29).

Greater Yellow - Finch



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Chirihue verdoso

Sicalis olivascens



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 13 - 14 cm. El chirihue verdoso se distribuye desde Arica hasta Coquimbo entre los 1.000 y 3.800 m.s.n.m. Es común en la zona arbustiva prepuneña, en zonas secas semidesérticas y altiplano. También es habitual en los pueblos de la cordillera. Normalmente se ve en pareja o en grupos, aunque en invierno forma grandes bandadas. Comúnmente se observa posado en laderas o rocas más que en los arbustos. Se alimenta en el suelo. Se reproduce entre diciembre y marzo. Su nido es hecho de pasto ubicado en una grieta, suelo, risco o pared rocosa e incluso en grietas en alguna construcción de adobe. Pone 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembra diferentes. A la izquierda, chirihue hembra observada en la zona de Neurara (29). A la derecha, un individuo macho en las cercanías de la localidad de Socaire (23).

Greenish Yellow - Finch



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Diuca común

Diuca diuca crassirostris



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 16 - 17 cm. En Chile están presentes 3 subespecies de diuca común. La subespecie en la Región de Antofagasta se distribuye entre Antofagasta y el norte de Coquimbo, desde el nivel del mar hasta los 2.000 m. de altitud. Habita matorrales en montañas costeras, zonas agrícolas, bosque esclerófilo, e incluso al interior de las ciudades. Solitaria o en pareja, forma bandadas en invierno, en las que puede estar asociada a varias especies, aunque algunas veces se presenta muy agresiva frente a éstas. El macho canta desde muy temprano en las mañanas. Se alimenta en el suelo de semillas y artrópodos. Su nido tiene forma de taza, es hecho de pastos y fibras; puede estar en cualquier arbusto o árbol chico, pero nunca en el suelo. Pone generalmente 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, una diuca hembra. A la derecha, un macho. Ambos adultos fotografiados en la Quebrada Paposo (49).

Common Diuca-Finch



Fotografía: Charly Moreno Taucare

Comesebo de los tamarugos (Mielerito de los tamarugos) Tamarugo Conebill

Conirostrum tamarugense



Fotografía: Marcos Cortés Araya

DESCRIPCIÓN: L. 11 - 12 cm. En Chile, el comesebo de los tamarugos se distribuye entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. de altitud. Habita preferentemente bosques de tamarugos y laderas vegetadas de la zona desértica. Solitario, en pareja o pequeños grupos que se desplazan estacionalmente. Es insectívoro especializado. Se reproduce entre septiembre y diciembre coincidiendo con la floración del tamarugo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Datos insuficientes (Insuficientemente conocida)*, según la Ley de Caza N° 19.473 (DS 5/1998, Ministerio de Agricultura). **Vulnerable**, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, la hembra es un poco más palida. Ambas imágenes corresponden a adultos fotografiados cerca de la localidad de Toconao (17).



Fotografía: Freddy Olivares Cortés

Cometocino de dorso castaño

Phrygilus dorsalis



Fotografía: Nelson Amado Pool

DESCRIPCIÓN: L. 14 - 15 cm. El cometocino de dorso castaño se distribuye en la puna de la Región de Antofagasta entre los 3.800 y 4.200 m.s.n.m. Se encuentra en los bordes de los bofedales adyacentes a laderas rocosas. Solitario o en pareja, aunque en invierno forma bandadas pequeñas. Se alimenta en el suelo de semillas y artrópodos. Tiene un despliegue nupcial en el cual se eleva y desciende planeando emitiendo su canto. Se reproduce entre febrero y mayo. El nido es suelto, semiesférico, construido con lanas, pelos y plumas, en el interior de una grieta en afloramientos rocosos. Pone de 1 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual, hembra y macho idénticos. A la izquierda, un adulto en las Vegas de Quepiaco (19). A la derecha, un adulto en el vado del Río Putana (12).

Red-backed Sierra-Finch



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Cometocino de Gay

Phrygilus gayi



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 14 - 16 cm. El cometocino de Gay se distribuye desde el sur de la Región de Antofagasta hasta la Región del Bío Bío. Presente en ambientes abiertos desde matorrales desérticos hasta laderas andinas. Solitario o en pareja, aunque en invierno forma grupos pequeños. Se alimenta en el suelo, principalmente de semillas e invertebrados y también de frutos. Construye un nido amplio entre matorrales o arbustos a muy baja altura o en el suelo, aunque siempre bien escondido. Pone de 2 a 5 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo macho. A la derecha, una hembra. Ambas fotos fueron tomadas en la Quebrada Paposo (49).

Grey-hooded Sierra-Finch



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Cometocino del norte

Phrygilus atriceps



Fotografía: Aracelli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 15 - 16 cm. Esta especie de cometocino se distribuye en la zona cordillerana, desde el extremo norte hasta Baños del Toro (Coquimbo), entre los 2.500 y 4.500 m.s.n.m., habitando zonas rocosas cerca de humedales, bosques abiertos y alrededores de poblaciones humanas. Solitario o en pareja y a veces en grupos pequeños. Es muy confiado ante las personas, llegando virtualmente a comer de la mano. Se alimenta en el suelo de semillas e invertebrados y ocasionalmente, en asentamientos humanos, puede alimentarse de restos de comida. Su reproducción es principalmente de noviembre a enero, pero puede nidificar durante todo el año. Su nido es muy bien construido a base de tallos y pastos secos; puede ser ubicado a ras de suelo, en arbustos tupidos, techos u otros lugares que le proporcionen seguridad. Pone 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembras diferentes. A la izquierda, una hembra. A la derecha, un macho. Ambos adultos fueron fotografiados en la zona de Guatín (14).

Black-hooded Sierra-Finch



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Pájaro plomo

Phrygilus unicolor



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Plumbeous Sierra-Finch

DESCRIPCIÓN: L. 15 - 17 cm. El pájaro plomo se distribuye entre Arica y Tierra del Fuego, habitando en las laderas rocosas andinas y los bordes de los pantanos o bofedales hasta los 5.000 m.s.n.m. En el altiplano, a menudo se ve cerca de asentamientos humanos. Solitario o en pareja, en invierno forma grandes bandadas. En general es una especie poco conspicua. Se alimenta en el suelo principalmente de semillas y sus polluelos son alimentados con invertebrados. Suele anidar entre las piedras de algún muro o pedregales en los faldeos de los cerros. Pone de 2 a 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual, la hembra es parda y totalmente estriada. Ambas fotografías corresponden a un individuo macho en el vado del Río Putana (12).



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Pizarrita

Xenospingus concolor



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Slender-billed Finch

DESCRIPCIÓN: L. 12 cm. En Chile, el pizarrita se distribuye casi exclusivamente entre Arica y Antofagasta. Habita ambientes semiáridos con matorrales adyacentes a cursos de agua y desembocaduras de ríos, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Solitario, en parejas o grupos familiares. Suele desplazarse escondido entre las ramas en busca de su alimento. A veces se posa brevemente en ramas más expuestas a emitir cantos territoriales. Se alimenta principalmente de insectos y ocasionalmente de semillas y frutas. Se reproduce en el sur del Perú entre diciembre y junio.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Casi amenazada*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Sin dimorfismo sexual. Ambas imágenes corresponden a un adulto observado en la zona del Puente Posada (36).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Plebeyo

Phrygilus plebejus



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Ash-breasted Sierra-Finch

DESCRIPCIÓN: L. 11 - 13 cm. El plebeyo es el ave más corriente del altiplano chileno y se distribuye desde Arica hasta Antofagasta entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m., habitando preferentemente ambientes secos, generalmente laderas rocosas con algo de gramíneas. Se puede observar solitario, en pareja o pequeñas bandadas, y fuera de la época reproductiva, forma grandes bandadas. Se alimenta en el suelo, principalmente de semillas y también de artrópodos. Anida en el suelo y pone 2 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembra diferentes. A la izquierda, una hembra en la zona del Salar de Carcote (5). A la derecha, un macho en la Laguna Aguas Calientes (4).



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Yal común

Phrygilus fruticeti



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 17 - 19 cm. El yal común está presente en la precordillera entre Arica y Tierra del Fuego hasta los 4.000 m.s.n.m. Es fácil observarlo, pero siempre entre arbustos o matorrales y en pastizales abiertos solo si están rodeados de arbustos. Solitario o en pareja, en invierno se asocia en bandadas pequeñas. El macho es muy conspicuo y acostumbra a emitir su canto territorial desde un sitio alto y despejado. Su nido es de construcción suelta y pone generalmente 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, una hembra en la zona de Guatín (14). A la derecha, un macho en las cercanías de Socaire (23).

Mourning Sierra-Finch



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Chincol

Zonotrichia capensis antofagastae



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Rufous-collared Sparrow

DESCRIPCIÓN: L. 14 - 16 cm. En Chile existen 5 subespecies de chincol. La subespecie *antofagastae* se distribuye entre Arica y Antofagasta, desde el nivel del mar hasta los 4.500 m. de altitud. Explora una gran cantidad de ambientes y muy asociado a la presencia humana: campos, cerros, huertos, jardines y plazas de ciudades. Se alimenta de semillas, frutos y artrópodos. Solitario o en pareja, muy confiado ante la presencia humana. Su canto es característico y conocido. Su reproducción comienza en septiembre y el nido lo coloca en cualquier arbusto, árbol chico o matorral, aunque a veces lo hace en el suelo escondido entre el pasto. Pone generalmente 3 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, un individuo hembra en un parque de Antofagasta (47). A la derecha, un macho en la zona de Guatín (14).



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

Reinita americana

Setophaga ruticilla



Fotografía: Ariel Silva Narváez

American Redstart

DESCRIPCIÓN: L. 12 cm. La reinita americana es un ave migratoria que durante el verano austral visita la zona norte de Chile. Habita valles cultivados con abundantes arbustos, jardines y plazas de pueblos, desde el nivel del mar hasta los 3.500 m. de altitud. De comportamiento muy activo, aunque por lo general, se observa escondida entre el follaje. Se alimenta principalmente de insectos, frutos y semillas. Nidifica en Norteamérica, construye su nido en árboles y arbustos. Pone entre 2 y 5 huevos

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. El macho es de plumaje reproductivo negro, de alas y cola negra con anaranjado. Ambas fotografías corresponden a una hembra adulta observada en la localidad de Baquedano (41).



Fotografía: Ariel Silva Narváez

Loica peruana

Sturnella bellicosa



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

DESCRIPCIÓN: L. 20 - 22 cm. Esta loica se distribuye entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta. Habita sectores semiáridos con vegetación arbustiva. Desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Solitaria o en pareja. Muy territorial. Se alimenta en el suelo de vertebrados pequeños, semillas y frutos. Su nido es una suave depresión en el suelo cubierto de hierba seca y tallos, oculto por pasto alto o arbustos bajos. Pone 3 a 4 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembra diferentes, la hembra es un poco más pálida, garganta y pecho rosado. Ambas imágenes corresponden a un macho observado en el Valle de Jere (18).

Peruvian Meadowlark



Fotografía: Marietta Perucci Letelier

Jilguero cordillerano

Spinus uropygialis



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

DESCRIPCIÓN: L. 12 cm. El jilguero cordillerano se distribuye principalmente entre la Región de Atacama y la Región del Bio Bío. Habita laderas pedregosas, acantilados y matorrales, especialmente cerca de cursos de agua. Desde los 2.500 hasta los 4.000 m.s.n.m.; algunas veces se puede observar a menores alturas, aunque es muy raro a nivel del mar. Forma bandadas pequeñas y es evidente por sus cantos continuos mientras se alimenta y vuela. Come principalmente semillas e insectos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Macho y hembra diferentes, las hembras son más apagadas y un poco más pardas que los machos. Ambas imagenes corresponden a individuos adultos observados en la Quebrada Paposo (49).

Yellow-rumped Siskin



Fotografía: Nelson Amado Pool

Jilguero negro

Spinus atratus



Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

DESCRIPCIÓN: L. 12 cm. El jilguero negro se distribuye de Arica a Antofagasta entre los 3.500 y 5.000 m.s.n.m. En algunas oportunidades se desplaza a Coquimbo e incluso ha sido observado en Santiago. Habita ambientes arbustivos secos de la alta cordillera (puna) y zona precordillerana, usualmente cerca del agua y de bofedales. Se alimenta de semillas que recoge desde el suelo o de los arbustos, ocasionalmente se alimenta de insectos. Usualmente se ve en bandadas pequeñas o en pareja durante el período de cría. La postura de huevos es entre noviembre y diciembre.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Leve dimorfismo sexual, las hembras son un poco más pardas. A la izquierda, un macho adulto observado al sur de Tilopozo (27). A la derecha, un adulto y un juvenil (a la derecha de la fotografía) observados en la zona del Valle de Puques (entre San Pedro de Atacama y Toconao) (16).

Black Siskin



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

Gorrión

Passer domesticus



Fotografía: Ariel Silva Narváez

DESCRIPCIÓN: L. 15 cm. En Chile, el gorrión se distribuye entre Arica y Tierra del Fuego, también en la Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández, habitando desde el nivel del mar hasta los 4.000 m. de altitud. Tiene una marcada preferencia hacia los lugares cercanos al hombre, como jardines, plazas, huertos y chacras de ciudades, pueblos y caseríos. Su alimentación consiste en insectos durante la época de reproducción y de semillas y granos durante el resto del tiempo. Se ve solitario, en pareja o grupos. Muy agresivo, desplaza a otras especies nativas atacándolas directamente y destruyendo sus nidos y huevos. Anida en casi cualquier parte que le ofrezca protección para su abultado nido. Aprovecha aleros y entretechos de casas, establos u otra construcción similar. También aprovecha salientes en rocas, grietas en muros o grupos de hojas secas de algún árbol. Suele poner entre 3 y 7 huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Preocupación menor*, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2017).

Marcado dimorfismo sexual. A la izquierda, una hembra. A la derecha, un gorrión macho. Ambas fotografías fueron tomadas en un parque en la ciudad de Antofagasta (47).

House Sparrow



Fotografía: Araceli Marín Aguilar

AVES REGISTRADAS EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
SIN PRESENTACIÓN EN ESTE LIBRO
(EN ORDEN ALFABÉTICO)

1	Águila - <i>Geranoaetus melanoleucus</i>	25	Dormilona rufa - <i>Muscisaxicola capistratus</i>
2	Águila pescadora - <i>Pandion haliaetus</i>	26	Fardela atlántica - <i>Puffinus puffinus</i>
3	Ave del trópico de pico rojo - <i>Phaethon aethereus</i>	27	Fardela capirotada - <i>Ardenna gravis</i>
4	Bailarín - <i>Elanus leucurus</i>	28	Fío-fío - <i>Elaenia albiceps</i>
5	Canastero común - <i>Pseudasthenes humicola</i>	29	Gallina ciega chica - <i>Systellura decussata</i>
6	Cazamoscas real - <i>Tyrannus melancholicus</i>	30	Gaviota argéntea - <i>Larus argentatus</i>
7	Charlatán - <i>Dolichonyx oryzivorus</i>	31	Gaviota cáhuil - <i>Chroicocephalus maculipennis</i>
8	Chirihue común - <i>Sicalis luteola</i>	32	Gaviota de Sabine - <i>Xema sabini</i>
9	Chorlo ártico - <i>Pluvialis squatarola</i>	33	Gaviotín apizarrado - <i>Onychoprion fuscatus</i>
10	Chorlo chileno - <i>Charadrius modestus</i>	34	Gaviotín ártico - <i>Sterna paradisaea</i>
11	Chorlo de collar - <i>Charadrius collaris</i>	35	Gaviotín boreal - <i>Sterna hirundo</i>
12	Chorlo gritón - <i>Charadrius vociferus</i>	36	Gaviotín de Sandwich - <i>Thalasseus sandvicensis</i>
13	Churrete acanelado - <i>Cinclodes fuscus</i>	37	Golondrina barranquera - <i>Riparia riparia</i>
14	Churrete chico - <i>Cinclodes oustaleti</i>	38	Golondrina chilena - <i>Tachycineta leucopyga</i>
15	Cisne de cuello negro - <i>Cygnus melancoryphus</i>	39	Golondrina de los riscos - <i>Orochelidon andecola</i>
16	Codorniz - <i>Callipepla californica</i>	40	Golondrina de mar de cara blanca - <i>Pelagodroma marina</i>
17	Colegial común - <i>Lessonia rufa</i>	41	Golondrina de mar de vientre blanco - <i>Fregetta grallaria</i>
18	Cóndor - <i>Vultur gryphus</i>	42	Golondrina de mar de común - <i>Oceanites oceanicus</i>
19	Corbatita común - <i>Sporophila caerulescens</i>	43	Golondrina de mar negra - <i>Oceanodroma markhami</i>
20	Cotorra argentina - <i>Myiopsitta monachus</i>	44	Golondrina de mar peruana - <i>Oceanodroma tethys</i>
21	Cuervo de pantano de cara pelada - <i>Phimosus infuscatus</i>	45	Golondrina grande - <i>Petrochelidon pyrrhonota</i>
22	Dormilona de ceja blanca - <i>Muscisaxicola albilora</i>	46	Halcón pecho naranja - <i>Falco deiroleucus</i>
23	Dormilona de frente negra - <i>Muscisaxicola frontalis</i>	47	Huairavillo chico - <i>Ixobrychus exilis</i>
24	Dormilona de la puna - <i>Muscisaxicola juninensis</i>	48	Jote de cabeza negra - <i>Coragyps atratus</i>

AVES REGISTRADAS EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
SIN PRESENTACIÓN EN ESTE LIBRO
(EN ORDEN ALFABÉTICO)

49	Lechuza - <i>Tyto alba</i>	73	Playero enano - <i>Calidris minutilla</i>
50	Mirlo común - <i>Molothrus bonariensis</i>	74	Playero manchado - <i>Actitis macularius</i>
51	Naranjero - <i>Pipraeidea bonariensis</i>	75	Reinita de garganta naranja - <i>Setophaga fusca</i>
52	Paloma picazuro - <i>Patagioenas picazuro</i>	76	Saca tu real - <i>Pyrocephalus rubinus</i>
53	Pato negro - <i>Netta peposaca</i>	77	Salteador chico - <i>Stercorarius parasiticus</i>
54	Pato rana de pico ancho - <i>Oxyura jamaicensis</i>	78	Salteador chileno - <i>Stercorarius chilensis</i>
55	Pelícano pardo - <i>Pelecanus occidentalis</i>	79	Salteador de cola larga - <i>Stercorarius longicaudus</i>
56	Petrel damero - <i>Daption capense</i>	80	Salteador pomarino - <i>Stercorarius pomarinus</i>
57	Petrel de Juan Fernández - <i>Pterodroma externa</i>	81	Tángara golondrina - <i>Tersina viridis</i>
58	Petrel de masatierra - <i>Pterodroma defilippiana</i>	82	Tordo - <i>Curaeus curaeus</i>
59	Petrel de Parkinson - <i>Procellaria parkinsoni</i>	83	Tortolita boliviana - <i>Metriopelia ceciliae</i>
60	Petrel gigante antártico - <i>Macronectes giganteus</i>	84	Tortolita cuyana - <i>Columbina picui</i>
61	Petrel negro de Juan Fernández - <i>Pterodroma neglecta</i>	85	Vari común - <i>Circus cinereus</i>
62	Petrel paloma pico delgado - <i>Pachyptila belcheri</i>	86	Vencejo de chimenea - <i>Chaetura pelagica</i>
63	Picaflor chico - <i>Sephanoides sephaniodes</i>	87	Zarapito de pico recto - <i>Limosa haemastica</i>
64	Picaflor de la puna - <i>Oreotrochilus estella</i>	88	Zorzal común - <i>Turdus falcklandii</i>
65	Picaflor gigante - <i>Patagona gigas</i>	89	Zorzalito de Swainson - <i>Catharus ustulatus</i>
66	Pimpollo - <i>Rollandia rolland</i>		
67	Pingüino de Magallanes - <i>Spheniscus magellanicus</i>		
68	Piquero blanco - <i>Sula dactylatra</i>		
69	Pitío del norte - <i>Colaptes rupicola</i>		
70	Pitotoy chico - <i>Tringa flavipes</i>		
71	Platero - <i>Phrygilus alaudinus</i>		
72	Playero ártico - <i>Calidris canutus</i>		



Gaviota garuma (Adulto y polluelo) en el sitio de nidificación Cerro Plomo, 105 km. al sureste de Antofagasta, en pleno Desierto de Atacama
Fotografía: Roberto Aguilar Pulido

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre, J. & H. Torres 2005 Aves de los humedales altoandinos del Norte de Chile. 180 pp.

Araya B. y G. Millie 1991 Guía de campo de las aves de Chile. Cuarta Edición. Editorial Universitaria, Santiago, 405 pp.

Barros, R., A. Jaramillo y F. Schmitt 2015 Lista de Aves de Chile. La Chiricoca N° 20, Noviembre 2015, p. 79 - 100.

Chester, S. 2008 A Wildlife Guide to Chile. A&C Black Publishers Ltd. London. 392 pp.

Couve, E., C. Vidal y J. Ruiz. 2016 Aves de Chile, sus Islas Oceánicas y Península Antártica. Una guía de campo ilustrada. FS Editorial. Punta Arenas, Chile. 551 pp.

Jaramillo, A. 2011 Aves de Chile. Linx Ediciones, Barcelona. 240 pp.

Lazo, I. 2004 Guía de las aves más frecuentes en Chile. Imaginación Digital Ltda. Santiago. 144 pp.

Martínez, D. & G. González 2004 Las Aves de Chile, una nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista. Santiago, 620 pp.

Ministerio de Agricultura , Decreto Supremo: N° 5/1998 - Ley de Caza N° 19.473

Ministerio del Medio Ambiente, Decretos Supremos: N° 42/2011 - N° 13/2013 - N° 38/2015 - N° 16/2016

MInisterio Secretaría General de la Presidencia, Decretos Supremos: N° 151/2007 - N° 50/2008

Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, C. D. Cadena, A. Jaramillo, M. Nores, J. F. Pacheco, J. Pérez-Emán, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz, and K. J. Zimmer. 2016. A classification of the bird species of South America countries and territories: Chile. American Ornithologists’ Union. [versión 1, abril 2017] <http://www.museum.lsu.edu/Remsen/SACCBaseline.htm>

Sítios web:
Aves de Chile < www.avesdechile.cl >
eBird Chile < [www. eBird.org /chile/](http://www.eBird.org/chile/) >
The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2017-1. < www.iucnredlist.org >. 26 mayo 2017.
American Ornithologists’ Union < <http://www.museum.lsu.edu/Remsen/SACCBaseline.htm>

